

# トップガン250グラム（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキ

適用雑草と使用方法

2007年6月20日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ(東北) クダマ(東北) シズイ(東北) セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ(東北) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ ルビ2.5葉期（但し、 移植後30日 まで）	砂壤土～ 埴土	250g/10a	1回	湛水散布、 湛水周縁散 布又は無人 ヘリコプターに よる散布	東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
	水田一年生雑 草 ウリカ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ アオミドロ・藻類 による表層は く離	移植後3日 ～ルビ2.5 葉期（但し 、移植後30 日まで）					北海道				

# トップガン250グラム（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキ

適用雑草と使用方法

2007年6月20日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ハラオモタカ ホタルイ マツバイ アオミドリ・藻類による表層はく離	移植後3日 ～レ <sup>2</sup> 2.5 葉期（但し 、移植後30 日まで）	砂壤土～ 埴土	250g/10a	1回	湛水散布、 湛水周縁散 布又は無人 ヘリコプターに よる散布	北海道	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	水田一年生 雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ	稲1葉期～ノ レ <sup>2</sup> 2.5葉期 （但し、収 穫90日前ま で）					北海道、 東北				