

トップガンLジャンボ（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサ

適用雑草と使用方法

2008年5月14日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ(近畿・中国・四国を除く) ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離(近畿・中国・四国、九州)	移植後3日～ レ ² 5葉期(但し、移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土	小包装(パック)10個(250g)/10a	1回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ	稲1葉期～ レ ² 5葉期(但し、収穫90日前まで)					全域(北海道、東北を除く)				

トップガンLジャンボ（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサ

適用雑草と使用方法

2008年5月14日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>ヒメジョオン ヒメジョオン ヒメジョオン ヒメジョオン ヒメジョオン</small>	稲1葉期～12.5葉期（ 但し、収穫90日前まで）	砂壤土～埴土	小包装（100g）1 0個（250g）/10a	1回	水田に小包装（100g） のまま投げ入れる	全域（北海道、 東北を除く）	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内