

# パットフルエースL 250 グラム (オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・

適用雑草と使用方法

2007年9月19日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	クロメプロップを含む農薬の総使用回数	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ(北陸を除く) クログワイ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)	移植後1日～ル <sup>レ</sup> E2.5葉期(但し、移植後30日まで)	砂壤土～埴土	250g/10a	1回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人ヘリコプターによる散布	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内

# パットフルエースL 250 グラム (オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・

適用雑草と使用方法

2007年9月19日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	クロメプロップを含む農薬の総使用回数	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻		移植後1日～ヒエ2.5葉期 (但し、移植後30日まで)	砂壤土～埴土	250g/10a	1回	灌水散布、灌水周縁散布又は無人ヘリコプターによる散布	全域 (北海道、東北を除く) の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内