

フォーマット 1 キロ粒剤 5 1 (ダイムロン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル・ペント

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | ダイムロンを含む農薬の総使用回数 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
|------|--|---|------------|---------|---------|------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 移植水稻 | 水田一年生雑草 ウリカ ホトカ(北陸を除く) クグワイ セリ ヒルムシロ(北陸を除く) ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオシロ・藻類による表層はく離(北陸を除く) | 移植直後～ ル ¹ I3葉期 (但し、移植後30日まで) | 砂壤土～ 埴土 | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布 | 全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯 | 3回以内 (但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| | | 移植時 | | | | 田植同時散布機で施用 | | | | | |
| 直播水稻 | 水田一年生雑草 ウリカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ | 稲1葉期～ ル ¹ I3葉期 (但し、収穫90日前まで) | 壤土～埴土 | | | 湛水散布 | 全域(北海道、東北を除く) | 2回以内 | | | |

フォーマット 1 キロ粒剤 5 1 (ダイムロン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル・ペント

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | ダイムロンを含む農薬の総使用回数 | ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数 |
|------|--|--------------------------|-------|---------|---------|------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 直播水稻 | <small>水田一年生雑草 9197 9198 7574 22-2-112</small> | 稲1葉期～ヒレ13葉期（但し、収穫90日前まで） | 壤土～埴土 | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布 | 全域（北海道、東北を除く） | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |