

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数	
とうもろこし	ハダニ類 オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
かんしょ	ハダニ類 ハスモンヨトウ	2000～4000倍	1.6L/10a					無人航空機による散布
	ヨツモンカメノコハムシ シロイモジヨトウ							16倍
さといも	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
やまのいも	カンザワハダニ ナガイモガ			収穫前日まで				
かぶ	コナガ ナモクシバエ ヨトウムシ							
しょうが	ハスモンヨトウ	32倍	3.2L/10a					無人航空機による散布
だいこん	コナガ ダイコンサルハムシ アオムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回	
てんさい	ハダニ類 カメノコハムシ ヨトウムシ			収穫7日前まで				
にんじん	キアゲハ ヒョウタンツグムシ類 ヨトウムシ			収穫前日まで				
葉にんにく	ハダニ類			収穫14日前まで				

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ヒョウタンゾウムシ類 ネギハモグリバエ ネギコガ シロイモシヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
あずき	ハダニ類 メイガ類			収穫3日前まで			
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげんを除く)	ハダニ類			収穫前日まで			
えだまめ	コキゾウムシ ハダニ類						
さやいんげん	ハダニ類 アズキノメイガ						
さやえんどう 実えんどう	ハダニ類 ハスモンヨトウ						
うり類(漬物用)	ミナキイロアザミウマ ハダニ類						
きゅうり	ミナキイロアザミウマ ミナキイロアザミウマ ハダニ類 ウリハムシ ウリノメイガ				3回以内	3回以内	

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
にがうり かぼちゃ(日本かぼちゃ)	ミナキイロアザミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	すいか	4000倍					
	ハダニ類 ウリノメイガ オオタバコガ	2000倍					
トマト ミニトマト	トマトサビダニ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ オオタバコガ トマトキハガ				3回以内		3回以内
なす	ミカンキイロアザミウマ ミナキイロアザミウマ テントウムシダマシ類 ハダニ類 オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ チャノホコリダニ				4回以内		4回以内
ピーマン とうがらし類(ししとうを除く)	ミカンキイロアザミウマ ミナキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ				2回以内		2回以内
ししとう	ヒラスハナアザミウマ	4000倍					
	ミカンキイロアザミウマ ミナキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ	2000倍					

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数		
ししとう	ミカンキロアザミウマ ミナキキロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
カリフラワー	コナガ			収穫3日前まで					
茎ブロッコリー	アオムシ			収穫前日まで					
ブロッコリー	コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイモシヨトウ アオムシ			収穫3日前まで					
ザーサイ	ハスモンヨトウ			収穫14日前まで					
エンサイ				収穫3日前まで					
つるむらさき				収穫7日前まで					
モロヘイヤ	アザミウマ類			1回				2回以内	1回
やなぎたで	ハスモンヨトウ			2回以内					
非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、なばな類、非結球はくさい、非結球キャベツを除く）	コナガ			収穫14日前まで				1回	1回
こまつな	コナガ ハクサイタニ アオムシ	収穫3日前まで							
チンゲンサイ	コナガ	収穫7日前まで	2回以内	2回以内					
非結球キャベツ	ハスモンヨトウ	2回以内							
なばな類		収穫3日前まで							

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数		
非結球はくさい	コナガ アオムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内		
キャベツ	タマキニンウハ コナガ ハイマダノメイガ オオハコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモシヨトウ アオムシ			収穫前日まで					
はくさい	コナガ カブラハバチ ヨトウムシ アオムシ			収穫7日前まで					
メキャベツ	ハスモンヨトウ			収穫14日前まで					
あしたば	ウトノメイガ			収穫14日前まで					
コリアンダー(葉)	ハスモンヨトウ			親株養成期(但し、 収穫90日前まで)				3回以内	3回以内
セルリー	ヨトウムシ			収穫14日前まで(但し、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで)				1回	1回
はまぼうふう(葉)	ハダニ類			収穫前日まで				2回以内	2回以内
みつば	ハスモンヨトウ			収穫7日前まで					
レタス	ナモクリハエ オオハコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ								
きく(葉)	アブラムシ類 ミナモトアブラムシ ハダニ類 オオハコガ ヨトウムシ類								

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
きく(葉)	アワダチソウゲンハイ ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ ヨトウムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
しゅんぎく	ハスモンヨトウ	4000～6000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内		
すいぜんじな	ハダニ類 ヨトウムシ			収穫前日まで			
葉ごぼう	ハスモンヨトウ			収穫7日前まで			
よもぎ	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで			
ほうれんそう	ホウレンソウウケナガコナダニ			2葉期まで(但し、 収穫14日前まで)			
アスパラガス	ハダニ類 ジユウシホシクビナガハムシ オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ			2000倍		100～500L/10a	収穫前日まで
うど	シクラメンホコリダニ	100～300L/10a	100～300L/10a	根株養成期(但し、 収穫75日前まで)	1回	3回以内	1回
さといも(葉柄)	カンザワハダニ			収穫3日前まで			
はすいも(葉柄)	ハスモンヨトウ			収穫前日まで			
つわぶき	ハダニ類			収穫14日前まで			

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ふき	ハダニ類 ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
食用エキザガム	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類			収穫14日前まで			
食用ぎく	アワダチソウゲンバイ ミカンキイロアザミウマ ミナキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ ヨトウムシ類			収穫3日前まで			
食用金魚草 食用せんにちこう 食用トニア 食用なでしこ 食用パンプキン	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類			収穫14日前まで			
食用フリムラ	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類 ハスモンヨトウ			収穫14日前まで			
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類			収穫3日前まで			
いちご	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ			収穫前日まで			
おくら	オオタバコガ ハスモンヨトウ			収穫前日まで			
たらのき	ハダニ類			収穫90日前まで			
なんてん(葉)	アザミウマ類			収穫14日前まで			

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ふき(ふきのとう)	ハダニ類 ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫90日前まで	2回以内	散布	2回以内
やまのいも(むかご)	カンザワハダニ ナガイモコガ			収穫3日前まで			
ヤングコーン	ハダニ類 オオタバコガ ツマジロクサヨトウ			収穫前日まで			
みょうが(花穂)	ハダニ類			散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する			
みょうが(茎葉)				散布			
せんきゅう				みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで			
とうき		収穫前日まで					
みしまさいこ	ハスモンヨトウ	収穫14日前まで					
かんきつ	カネタキ リュウキュウミカンサビダニ ヨモギエダシヤク スグリゾウムシ ハスモンヨトウ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	収穫21日前まで		

適用拡大登録月日：2024年03月27日



# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンサビダニ アザミウマ類(ネアザミウマを除く) チャノホコリダニ	2000～6000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
なし	ニセナシサビダニ カンザワハダニ ナミハダニ	2000～3000倍			3回以内		3回以内
	ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ	2000倍					
りんご	リンゴサビダニ ヨモギエダシヤク	2000～4000倍			2回以内		2回以内
	ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類 キンモンホリガ	2000倍					
おうとう	ウメシロカイガラムシ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ ナミハダニ オウトウショウジヨウバエ			収穫7日前まで			
もも	ウメシロカイガラムシ モモサビダニ カンザワハダニ ナミハダニ モモハモクリガ			収穫前日まで			
	ミカンキイロアザミウマ	2000～4000倍					

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ネクタリン	ウメシロカイガラムシ モモサビダニ カンザワハダニ ナミハダニ モモハモクリガ	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ミカンキイロアザミウマ	2000～4000倍					
小粒核果類	イラガ類 ウメシロカイガラムシ オウトウハダニ	2000倍		収穫前日まで			
ぶどう	コガネムシ類 カンザワハダニ ナミハダニ ミノガ類 モンキクロノメイガ ハスモンヨトウ トビイロトラガ ブトウハモクリダニ			収穫60日前まで			
	チャノキイロアザミウマ ミカンキイロアザミウマ ハマキムシ類 フタテンヒメヨコバイ ブトウサビダニ	2000～4000倍					
ブルーベリー	イラガ類 オウトウシヨウジヨウバエ	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ブルーベリー	イラガ類 オウトウショウジ ヨウバエ	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
マンゴー	チャノキイロアザミウマ			収穫14日前まで			
さんしょう(果実)		4000倍		収穫7日前まで			
ゴレンシ	カンザワハダニ	2000倍		収穫14日前まで			
いちじく	ヒラスハナアザミウマ カンザワハダニ ショウジ ヨウバエ類			収穫前日まで			
かき	イラガ類 カキサビダニ アザミウマ類 カキノタムシガ	2000～4000倍		収穫14日前まで			
	カンザワハダニ ナミハダニ	2000倍					
キウイフルーツ	コガネムシ類 キウヒメヨコバエ			収穫前日まで			
花き類・観葉植物(きく、ストックを除く)	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類		150～300L/10a	発生初期			
きく	アワダチソウゲンバエ ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ ヨトウムシ類						

適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ストック	コナガ ミカンキロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類 アオムシ	2000倍	150～300L/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
しきみ	クスアナアキゾウムシ		200～700L/10a				
		60倍	6～21L/10a			無人航空機による散布	
アザレア	チャノホコリダニ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで		散布	
飼料用とうもろこし(子実)	ハダニ類 オオタバコガ ツマジロクサヨトウ						
茶	チャトゲコナジラミ チャノナガサビダニ シャクトリムシ類 チャノキロアザミウマ カンザワハダニ チャノコカクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ		200～400L/10a	摘採7日前まで			


適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年3月27日現在


作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
茶	<small>茶葉害虫</small>	2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内

 適用拡大登録月日：2024年03月27日

# コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

2024年3月27日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
みかん	温室、ガラス室等密閉できる場所	ミカキイロアザミウマ	300mL/10a	10L/10a	収穫前日まで	2回以内	常温煙霧	2回以内
ぶどう		チャノキイロアザミウマ	150mL/10a	6L/10a	収穫14日前まで			

 適用拡大登録月日：2024年03月27日