

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数
かぶ	ハモグリバエ類	5000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
だいこん	コナガキスジノミハムシ アオムシ	2500～5000倍		収穫7日前まで			
にんじん	ハモグリバエ類	5000倍		収穫3日前まで			
にんじん(葉)	アザミウマ類			収穫前日まで			
はつかだいこん	コナガキスジノミハムシ アオムシ	2500～5000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
にんにく	アザミウマ類			収穫前日まで	3回以内		3回以内
らっきょう	シロイモジヨトウ	2500倍		収穫3日前まで			
あさつき		5000倍					
にら にら(花茎)	アザミウマ類	10000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
ねぎ	シロイモジヨトウ	2500～5000倍		収穫3日前まで			
		5000倍					
わけぎ	アザミウマ類	2500～5000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
	シロイモジヨトウ	5000倍					
さやいんげん さやえんどう 実えんどう	ハモグリバエ類	10000倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内		
未成熟ささげ 未成熟ふじまめ	アザミウマ類						
きゅうり	アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ	10000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
きゅうり(花)	アザミウマ類						

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数		
食用へちま	ハモグリバエ類	5000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
ズッキーニ	アザミウマ類	5000～10000倍			3回以内		3回以内		
ズッキーニ(花)		5000倍			2回以内		2回以内		
とうがんすいか									
メロン	アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ								
しょくようほおずき	アザミウマ類	10000倍			3回以内		3回以内		
トマト	アザミウマ類 ハモグリバエ類 オオタバコガ	5000倍			2回以内		2回以内		
ミニトマト									
なす	アザミウマ類	2500～5000倍							
ピーマン	オオタバコガ	5000倍							
	アザミウマ類								
甘長とうがらし	オオタバコガ	2500～5000倍							
	アザミウマ類	20000倍							
カリフラワー	コナガ	5000倍	収穫3日前まで	3回以内		3回以内			
ブロッコリー	コナガ アオムシ					4回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内)			
インサイ	アザミウマ類					2回以内	2回以内		
きゅうり(葉)		10000倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内				
つるな		2500倍	収穫3日前まで						
モロヘイヤ		5000倍							

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科葉菜類(みずな、非結球はくさいを除く)	コナガ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ類 アオムシ	2500～5000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
					3回以内		
みずな	コナガ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ類 アオムシ	5000倍		収穫3日前まで	1回		1回
非結球はくさい					2回以内		2回以内
キャベツ	タマキ、ンウバ コナガ ヨトウムシ シロイチモジ、ヨトウ アオムシ	2500～5000倍			3回以内		4回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内)
	アザミウマ類 ハイマダラノメイガ				5000倍		
はくさい	ウワバ類 コナガ ハイマダラノメイガ アオムシ	2500～5000倍					

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数		
はくさい	カブラハバチ類 ヨトウムシ	5000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内)		
メキャベツ	ハスモンヨトウ	2500倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内		
せり	アザミウマ類			収穫前日まで			2回以内		
セルリー	ハマグリバエ類			収穫3日前まで			3回以内		
パセリ	ヨトウムシ			収穫14日前まで			2回以内		
みつば	ハスモンヨトウ	5000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで)	1回	灌注	4回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内)		
レタス	ハマグリバエ類	500～1000倍		セル成型育苗トレイ11箱又はハ°-ハ°-ホット1冊(30×60cm、使用土壌約3L)当り500mL				定植前まで	
	オオタバコガ	2500～5000倍		100～300L/10a				収穫3日前まで	3回以内
	ヨトウムシ	5000倍							
非結球レタス	ハマグリバエ類	500～1000倍	セル成型育苗トレイ11箱又はハ°-ハ°-ホット1冊(30×60cm、使用土壌約3L)当り500mL	定植前まで	1回	灌注	3回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では2回以内)		

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数
非結球レタス	ハモグリバエ類	500～1000倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3L)当り500mL	定植前まで	1回	灌注	3回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では2回以内)
	オオタバコガ	2500～5000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	
	ヨトウムシ	5000倍					
きく(葉)	アザミマ類	10000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
すいぜんじな				収穫前日まで	2回以内		2回以内
よもぎ				収穫3日前まで	1回		1回
しそ科葉菜類					3回以内		3回以内
ふだんそう	ハスモンヨトウ	4000倍			2回以内		2回以内
ほうれんそう	アザミマ類 アサゲロハモグリバエ シロヒメノメイガ	5000倍		収穫前日まで			
アスパラガス	アザミマ類						
食用花(かんぞう(花)、食用ぎく、食用ミニバラを除く)		10000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
食用ぎく	ミカンキロアザミマ				2回以内		2回以内
食用ミニバラ	アザミマ類			収穫前日まで	3回以内		3回以内
しそ(花穂)				収穫3日前まで			
いちご		5000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年12月25日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数
グアバ(葉)	バンジロウツノエグリヒメハキ	2500～5000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
クレソン	コナガ	5000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
さんしょう(葉)	アゲハ	10000倍		3回以内	3回以内		
みょうが(花穂)	アザミウマ類	5000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	2回以内
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合 あつては開花期終了まで		散布	
ナスバリー			200～700L/10a	収穫3日前まで			
マンゴー	チャノキイロアザミウマ			収穫前日まで	1回		
いちじく	アザミウマ類		100～300L/10a	発生初期	2回以内		2回以内
花き類・観葉植物(きくを除く)							
きく	アザミウマ類 ハモグリバエ類		2500～5000倍				
	オオタバコガ						
樹木類	ケムシ類	5000倍	200～700L/10a				