

# ランネート45DF (メソミル水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年8月28日現在

| 作物名        | 適用害虫名  | 希釈倍数                | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メソミルを含む農薬の総使用回数        |  |
|------------|--|---------------------|--------------|----------|---------|------|------------------------|--|
| かぶ         | アブラムシ類<br>アオムシ   | 1000倍               | 100～300L/10a | 収穫7日前まで  | 2回以内    | 散布   | 2回以内                   |  |
| キャベツ       | アブラムシ類<br>タマキシンウハ<br>コナガ<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ<br>アオムシ     | 1000～2000倍          |              | 収穫14日前まで | 3回以内    |      | 3回以内                   |  |
| だいこん       | アブラムシ類<br>コナガ<br>ハイマダラノメイガ<br>アオムシ                       |                     |              | 収穫21日前まで | 2回以内    |      | 2回以内（但し、は種時の土壌混和は1回以内） |  |
| はくさい       | アブラムシ類<br>コナガ<br>ヨトウムシ<br>アオムシ                           |                     |              | 収穫14日前まで |         |      |                        |  |
| カリフラワー     | アブラムシ類<br>ヨトウムシ  |                     |              | 1000倍    | 収穫7日前まで |      |                        |  |
| ブロッコリー     | アブラムシ類<br>ヨトウムシ  | 1000～2000倍<br>1000倍 |              |          |         |      |                        |  |
| こまつな       | アブラムシ類   |                     |              | 収穫14日前まで | 3回以内    |      | 3回以内                   |  |
| チンゲンサイ     |  |                     |              | 2回以内     | 2回以内    |      |                        |  |
| かぼちゃ       | ワタアブラムシ  |                     | 収穫前日まで       | 3回以内     | 3回以内    |      |                        |  |
| ピーマン(露地栽培) | タバコガ<br>ハスモンヨトウ  | 1000～2000倍          | 収穫開始14日前まで   | 4回以内     | 4回以内    |      |                        |  |
| えだまめ       | ツメクサガ<br>カメムシ類<br>シロイチモジ<br>マダラメイガ<br>マメシンクイガ<br>ハスモンヨトウ |                     | 収穫7日前まで      | 3回以内     | 3回以内    |      |                        |  |

# ランネート45DF (メソミル水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年8月28日現在

| 作物名    | 適用害虫名                        | 希釈倍数       | 使用液量                | 使用時期           | 本剤の使用回数 | 使用方法     | メソミルを含む農薬の総使用回数          |
|--------|------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------|----------|--------------------------|
| アスパラガス | ネギアザミマ                       | 1000倍      | 100～300L/10a        | 収穫前日まで         | 1回      | 散布       | 2回以内（但し、散布は1回以内、灌注は1回以内） |
|        | ネギアザミマ<br>ナメクジ類              |            | 1～3L/m <sup>2</sup> | 収穫3日前まで        |         | 灌注       |                          |
| いちご    | コガネシジメ類幼虫                    | 1000～2000倍 | 2～3L/m <sup>2</sup> | 移植活着後（育苗期）     | 4回以内    | 散布       | 4回以内                     |
|        | イチゴメシジメ<br>イチゴセンチュウ          | 1000倍      | 100～300L/10a        | 定植後生育初期<br>育苗期 |         |          |                          |
|        | イチゴネグサセンチュウ                  | 1000～2000倍 | 1～2L/m <sup>2</sup> | 移植活着後（育苗期）     |         | 灌注       |                          |
| ごぼう    | アブラムシ類                       | 1000倍      | 100～300L/10a        | 収穫7日前まで        | 2回以内    | 散布       | 2回以内                     |
| しょうが   | ハスモンヨトウ                      | 1000～2000倍 |                     |                | 4回以内    |          | 4回以内                     |
| 食用ゆり   | クハバネキノコバエ類                   | 500倍       | -                   | 植付前            | 1回      | 30分間種球浸漬 | 1回                       |
| たまねぎ   | ネギアザミマ                       | 1000～2000倍 | 100～300L/10a        | 収穫7日前まで        | 4回以内    | 散布       | 4回以内                     |
| にら     | ネギアザミマ<br>ネギニ類<br>クハバネキノコバエ類 | 1000倍      | 1L/m <sup>2</sup>   | 収穫21日前まで       | 2回以内    | 灌注       | 2回以内                     |

# ランネート45DF（メソミル水和剤）

適用害虫と使用方法

2019年8月28日現在

| 作物名    | 適用害虫名                                   | 希釈倍数                | 使用液量              | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メソミルを含む農薬の総使用回数        |
|--------|---|---------------------|-------------------|----------|---------|------|------------------------|
| にんじん   | アブラムシ類<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ<br>クロハネキコバエ類 | 1000倍               | 100～300L/10a      | 収穫前日まで   | 2回以内    | 散布   | 2回以内（但し、は種前の土壌混和は1回以内） |
| ほうれんそう | アブラムシ類<br>ミナミキイロアザミウマ<br>ヨトウムシ          | 1000～2000倍          |                   | 収穫14日前まで | 4回以内    |      | 4回以内                   |
| らっきょう  | ネメト類                                    | 1000倍               | 1L/m <sup>2</sup> | 収穫21日前まで | 2回以内    | 灌注   | 2回以内                   |
| ねぎ     | ネメトアザミウマ<br>クロハネキコバエ類<br>シロイモジヨトウ       | 1000～2000倍<br>1000倍 | 100～300L/10a      | 収穫7日前まで  | 4回以内    | 散布   | 4回以内                   |
| レタス    | アブラムシ類<br>ヨトウムシ<br>ナメクジ類<br>オオタバコガ      | 1000～2000倍<br>1000倍 |                   | 収穫21日前まで | 2回以内    |      | 2回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内） |
| セルリー   | アブラムシ類<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ              |                     |                   | 収穫30日前まで |         |      | 2回以内                   |
| パセリ    | アブラムシ類                                  | 2000倍               |                   |          | 1回      |      | 1回                     |
| サラダ菜   | アブラムシ類<br>ヨトウムシ<br>オオタバコガ               | 1000～2000倍<br>1000倍 |                   | 収穫21日前まで | 2回以内    |      | 2回以内                   |

# ランネート45DF (メソミル水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年8月28日現在

| 作物名   | 適用害虫名   | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メソミルを含む農薬の総使用回数 |
|-------|---|------------|--------------|----------|---------|------|-----------------|
| だいず   | ツメクサガ<br>カメシ類<br>シロイモジ マダ ラメイガ<br>マメシクイガ<br>ハスモンヨトウ | 1000～2000倍 | 100～300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内    | 散布   | 4回以内            |
| かんしょ  | ナカジ ロシタバ<br>ハスモンヨトウ                                 | 1000倍      |              | 収穫7日前まで  | 5回以内    |      | 5回以内            |
| ばれいしょ | アブラムシ類<br>ニジュウヤホシテントウ<br>ナストビ ハムシ<br>ジャガイモガ         |            |              |          |         |      |                 |
| 茶     | チャトゲ コナジ ラミ<br>ハスモンヨトウ                              |            | 200～400L/10a | 摘採21日前まで | 2回以内    |      | 2回以内            |
|       | チャノキイロアザ ミウマ<br>ツマゲ ロアオカスミカメ                        | 1000～2000倍 |              |          |         |      |                 |
|       | コカモンハマキ<br>チャハマキ<br>ミドリヒメヨコバエ<br>チャノホソガ             | 1000～1500倍 |              |          |         |      |                 |
| てんさい  | トビハムシ<br>ヨトウムシ                                      | 1000～2000倍 | 100～300L/10a | 収穫7日前まで  | 5回以内    |      | 5回以内            |
| たばこ   | タバコガ<br>ヨトウムシ<br>ハスモンヨトウ                            | 倍          | 25～180L/10a  | 収穫10日前まで | 2回以内    |      | 2回以内            |

# ランネート45DF (メソミル水和剤)

適用害虫と使用方法

2019年8月28日現在

| 作物名 | 適用害虫名                  | 希釈倍数       | 使用液量        | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メソミルを含む農薬の総使用回数 |
|-----|------------------------|------------|-------------|----------|---------|------|-----------------|
| たばこ | タバコ<br>シロアリの<br>アザミヤドリ | 1000～2000倍 | 25～180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内    | 散布   | 2回以内            |