

クリアターン乳剤（ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン乳剤）

適用雑草と使用方法

2025年2月12日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
小麦	一年生雑草	は種直後（雑草発生前）	全土壌（但し、砂土を除く）	500～700 mL/10a	70～100L /10a	1回	全面土壌散布	北海道を除く全域	1回	1回	1回
				400～600 mL/10a				北海道			
大麦				500～700 mL/10a				北海道を除く全域			
とうもろこし				500～800 mL/10a				全域			
ばれいしょ		植付後～萌芽前（雑草発生前）		600～800 mL/10a							
にんじん		は種直後（雑草発生前）		500～700 mL/10a				2回以内（但し、は種直後は1回以内、にんじん3葉期以降は1回以内）			
だいず		500～800 mL/10a	2回以内（但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内）								

クリアターン乳剤（ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン乳剤）

適用雑草と使用方法

2025年2月12日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
だいず	一年生雑草	は種直後(雑草発生前)	全土壌(但し、砂土を除く)	500～800 mL/10a	70～100L/10a	1回	全面土壌散布	全域	1回	1回	2回以内(但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内)
		定植3日前まで(雑草発生前)		500～700 mL/10a							
		は種直後(雑草発生前)		500～800 mL/10a	100L/10a						
		定植3日前まで(雑草発生前)		500～700 mL/10a							
らっかせい	一年生雑草	は種直後(雑草発生前)	全土壌(但し、砂土を除く)	500～800 mL/10a	70～100L/10a	1回	全面土壌散布	全域	1回	1回	2回以内(但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内)
定植3日前まで(雑草発生前)		500～700 mL/10a									
えだまめ		は種直後(雑草発生前)		500～800 mL/10a	100L/10a						
定植3日前まで(雑草発生前)		500～700 mL/10a									
飼料用とうもろこし	一年生雑草	は種直後(雑草発生前)	全土壌(但し、砂土を除く)	500～800 mL/10a	70～100L/10a	1回	全面土壌散布	全域	1回	1回	2回以内(但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内)
定植3日前まで(雑草発生前)		500～700 mL/10a									
は種直後(雑草発生前)		500～800 mL/10a		100L/10a							
定植3日前まで(雑草発生前)		500～700 mL/10a									