

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2022年8月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数	
移植水稻 直播水稻	-	一年生雑草	耕起20～10日前 (雑草生育期)	400～600ml /10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内	1回	
麦類(小麦を除く)			耕起7日前まで (雑草生育期)							2回以内
小麦			耕起前(雑草生育期)							
										は種後出芽前(雑草生育期)
	多年生雑草	耕起前(雑草生育期)	500～1000ml/10a							
水田作物、畑作物(休耕田)	休耕田	一年生及び多年生雑草	雑草生育期							
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔		収穫14日前まで(雑草生育期)	400～600ml/10a						
水田作物(水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	500～2000ml/10a		1回		1回	1回	
		多年生雑草								
水田作物(水稻を除く)	-	一年生雑草	耕起20～10日前(雑草生育期)	400～600ml/10a				2回以内		
野菜類(きゅうり、トマト、なす、アスパラガス、ほうれんそう、たらのぎ、レタス、ホリフ(葉)、びわ(葉)、ビーマン及びとうがらし類、にんじん、薬用にんじん、だいこん、ねぎ、たまねぎ、豆類(種実)、えだまめ、かんしょを除く)			耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期)							


適用拡大登録月日：2022年08月10日

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2022年8月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
野菜類(きゅうり、トマト、なす、アスパラガス、ほうれんそう、たらのぎ、レタス、ホウレンソウ(葉)、びわ(葉)、ピーマン及びとうがらし類、にんじん、薬用にんじん、だいこん、ねぎ、たまねぎ、豆類(種実)、えだまめ、かんしょを除く)	-	一年生雑草	耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期)	400~600ml/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回	1回
かんしょ			耕起又は挿苗7日前まで(雑草生育期)					2回以内	
だいこん			耕起前又はは種7日前まで(雑草生育期)						
にんじん			耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期)						
薬用にんじん								10回以内(但し、1年間に2回以内)	
たまねぎ			耕起又は定植7日前まで(雑草生育期)					3回以内	3回以内


 適用拡大登録月日：2022年08月10日

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2022年8月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数	
たまねぎ	-	一年生雑草	定植後畦間処理：雑草生育期（但し、収穫30日前まで）	400～600ml/10a	100L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内	
ねぎ			耕起前又は定植7日前まで（雑草生育期）							
			定植後畦間処理：雑草生育期（但し、収穫30日前まで）							
豆類（種実、ただし、だいず、らっかせいを除く）			耕起前又はは種10日前まで（雑草生育期）			1回		2回以内	2回以内	1回
だいず			畦間処理：雑草生育期（但し、収穫前日まで）			2回以内		4回以内	4回以内	
			は種後出芽前（雑草生育期）							
らっかせい	耕起前又はは種7日前まで（雑草生育期）	1回	1回	1回						

 適用拡大登録月日：2022年08月10日

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2022年8月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数		
らっかせい	-	一年生雑草	耕起前又はは種7日前まで（雑草生育期）	400～600ml /10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回	1回		
えだまめ			耕起前又はは種10日前まで（雑草生育期）					3回以内	4回以内		
きゅうり トト なす			耕起前又は定植7日前まで（雑草生育期）					2回以内	1回		
ピーマン及びびとうがらし類										3回以内	
レタス ほうれんそう アスパラガス オリーブ(葉) たらのき びわ(葉)										3回以内	
果樹類(かんきつ、パイナップルを除く)			一年生及び多年生雑草					収穫7日前まで（雑草生育期）	400～1000ml/10a	3回以内	3回以内
かんきつ			5回以内								
きく		一年生雑草	耕起前又は定植前まで（雑草生育期）	400～600ml /10a	2回以内	2回以内					
樹木等		公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	スギナ	雑草生育期	1000～4000ml/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内		


適用拡大登録月日：2022年08月10日

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2022年8月10日現在


作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	スギナ 一年生及び多年生雑草	雑草生育期	1000～4000 mL/10a	100L/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
				500～1000 mL/10a					
牧草	牧野・草地		更新・造成10日前まで（雑草生育期）	400～750 mL/10a		1回	雑草茎葉散布		2回以内
茶	-		摘採7日前まで（雑草生育期）	400～600 mL/10a				2回以内	

 適用拡大登録月日：2022年08月10日

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

2022年8月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び多年生雑草	草丈抑制による刈込軽減	雑草生育期又は刈取後再生期(但し、収穫14日前まで)	50～150ml/10a	100L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内	2回以内

 適用拡大登録月日：2022年08月10日