

# ウィードレス粒剤 17 (カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤)

適用雑草と使用方法

2008年1月23日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	カフェンストロールを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ(北陸を除く) ハラモダカ(北陸) ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後5日～ルビE2.5葉期(但し、移植後30日まで)	砂壤土～埴土	3kg/10a	1回	湛水散布	北陸、関東・東山・東海、九州の普通期及び早期栽培地帯	1回	3回以内(但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内
	壤土～埴土		近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯							

# ウィードレス粒剤 17 (カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤)

適用雑草と使用方法

2008年1月23日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	カフェンストロールを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	<small>カヤネズミ シロイヌナズナ オシロイタケ オシロイタケ オシロイタケ オシロイタケ オシロイタケ</small>	移植後5日～12.5葉期 (但し、移植後30日まで)	壤土～埴土	3kg/10a	1回	湛水散布	近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯	1回	3回以内 (但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内