

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数		
稲	アブラムシ類 ヒメトビウンカ カメムシ類 イネシガレセンチュウ イネトコイムシ イネツトムシ アワヨトウ	1000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)		
	ヒメトビウンカ カメムシ類 イネハモグサリハエ イネヒメハモグサリハエ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ	30倍	3L/10a			空中散布			
	カメムシ類 ニカメイチュウ	300倍	25L/10a			散布			
		8倍	800mL/10a			空中散布 無人航空機による散布			
	イネシガレセンチュウ	1000倍	-			は種前		1回	6～72時間浸漬
		100倍							専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理又は塗沫処理
	イネハモグサリハエ ニカメイチュウ第1世代	1000～2000倍	60～150L/10a			収穫21日前まで		2回以内	散布

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
稲	イネヒメコガリハエ	2500倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)
	サカメイトウ第3世代 ニカメイトウ第2世代	800～1000倍					
	フタホトコヤガ	2000～4000倍					
稲(箱育苗)	イネシガラレシチュウ	1000倍	育苗箱(60×30×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500mL	硬化期～移植前日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	
麦類(大麦、小麦を除く)	アブラムシ類 ムキキコガリハエ アワヨトウ		60～150L/10a	収穫14日前まで		散布	1回
	アブラムシ類	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
	ヒメトビウカ					空中散布	
	ヒメトビウカ ムキアカタマハエ	30倍	3L/10a				
小麦	アブラムシ類 ムキキコガリハエ アワヨトウ	1000倍	60～150L/10a	収穫7日前まで		散布	
	アブラムシ類	250倍	25L/10a				

 適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数		
小麦	アブラムシ類	8倍	800mL/10a	収穫7日前まで	1回	無人航空機による散布	1回		
	ヒメビウカ	30倍	3L/10a			空中散布			
	ヒメビウカ ムギアカタマバエ					散布			
大麦	アブラムシ類 ムギキモグリバエ アワヨトウ	1000倍	60～150L/10a		無人航空機による散布	1回		散布	
	アブラムシ類	8倍	800mL/10a					無人航空機による散布	
	ヒメビウカ ムギアカタマバエ	30倍	3L/10a					空中散布	
	ヒメビウカ	8倍	800mL/10a					散布	
とうもろこし	カメムシ類 アワノメイガ ツマジロクサヨトウ	1000倍	100～300L/10a		収穫14日前まで	4回以内		散布	4回以内
かんしょ	アブラムシ類 ヨツモンカメノコハムシ イモコガ					5回以内			5回以内
こんにゃく	アブラムシ類			3回以内		3回以内			
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ類			250倍		25L/10a	収穫3日前まで		6回以内
	アブラムシ類	2回以内	2回以内						
ごぼう	アブラムシ類 フキノメイガ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内			

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数		
ごぼう	アブラムシ類 フキノメイガ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内		
てんさい	テンサイトビハムシ	1000倍		収穫21日前まで					
たまねぎ	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～2000倍 700～1000倍							
らっきょう		1000倍						収穫7日前まで	3回以内(但し、植付前は1回以内、植付後は2回以内)
	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	8倍	1.6L/10a	無人航空機による散布					
	ネダニ類	1000～2000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬			
にら		1000倍	3L/平方メートル	収穫14日前まで		株元灌注	1回		
ねぎ	アブラムシ類 アザミウマ類 ネギコガ	1000～2000倍 700～1000倍 1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内		
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、そらまめを除く)	アブラムシ類 カメムシ類 マヒメヤムシガ シロイチモジマダラメイガ ダズサヤマバエ	1000～2000倍 1000倍						4回以内	4回以内
	マメシクイガ	1000～1500倍							
あずき	アブラムシ類	1000～2000倍							

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
あずき	アブラムシ類	250倍	25L/10a	収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内
	カメムシ類 マメホリクチゾウムシ ナミハダニ マメヒメサヤムシガ シロイチモジマダラメイガ アズキノメイガ ダースサヤタマバエ	1000倍	100～300L/10a				
	マメシクイガ	1000～1500倍					
いんげんまめ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
	カメムシ類 インゲンマメゾウムシ インゲンテントウ マメヒメサヤムシガ シロイチモジマダラメイガ ダースサヤタマバエ	1000倍					
	マメシクイガ	1000～1500倍					
そらまめ	アブラムシ類	1000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
だいず		1000～2000倍		収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内
	カメムシ類 マメヒメサヤムシガ シロイチモジマダラメイガ ウコンノメイガ マメハンミョウ ダースサヤタマバエ	1000倍					
	カメムシ類 マメヒメサヤムシガ シロイチモジマダラメイガ マメシクイガ ダースサヤタマバエ	20倍	3L/10a				

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
だいず	カメムシ類 マヒメサヤムシガ シロイモジ マダ ラメイガ マメシクイガ ダ イズ サヤタバハエ	20倍	3L/10a	収穫21日前まで	4回以内	空中散布	4回以内
	カメムシ類 ダ イズ サヤムシガ シロイモジ マダ ラメイガ ウコンノメイガ マメシクイガ ダ イズ サヤタバハエ	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
	マメシクイガ	1000～1500倍	100～300L/10a			散布	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)	アブ ラムシ類	1000～2000倍	100～300L/10a				
	カメムシ類 マヒメサヤムシガ シロイモジ マダ ラメイガ ダ イズ サヤタバハエ	1000倍					
	マメシクイガ	1000～1500倍					
えだまめ	アブ ラムシ類	1000～2000倍					
	カメムシ類 マヒメサヤムシガ シロイモジ マダ ラメイガ ウコンノメイガ ダ イズ サヤタバハエ	1000倍					

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
えだまめ	カメムシ類 マヒメサヤムシガ シロイモジ マダ ラメイガ ウコンノメイガ ダ イズ サヤタバハエ	1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内
	マメシクイガ	1000～1500倍					
さやいんげん	アブラムシ類	1000～2000倍					
	カメムシ類 インゲンテントウ マヒメサヤムシガ シロイモジ マダ ラメイガ ダ イズ サヤタバハエ	1000倍					
	マメシクイガ	1000～1500倍					
	アブラムシ類	1000～2000倍					
未成熟そらまめ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
	カメムシ類 マヒメサヤムシガ シロイモジ マダ ラメイガ ダ イズ サヤタバハエ	1000倍					
	マメシクイガ	1000～1500倍					
	アブラムシ類	1000～2000倍					
きゅうり	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	アザミウマ類	1000倍					
しろうり	アブラムシ類	1000～2000倍					
	アザミウマ類	1000倍					
かぼちゃ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	アザミウマ類	700～1000倍					

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
すいか	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	6回以内	散布	6回以内
	アザミウマ類	700～1000倍					
メロン	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	アザミウマ類	1000倍					
トマト	アブラムシ類	2000倍		2回以内	2回以内		2回以内
	オオニジユウヤホシテントウ						
なす	アブラムシ類	1000～2000倍		5回以内	5回以内		5回以内
	テントウムシダマシ類						
モロヘイヤ	アブラムシ類	1000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	カメムシ類 マメコガネ アザミウマ類						
せり	アブラムシ類	2000倍	親株養成期(但し、 収穫45日前まで)				
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	1000～2000倍	収穫21日前まで				
うど	アブラムシ類 センノカミキリ ヒメシロコブゾウムシ ウトノメイガ ヨトウムシ	1000倍	根株養成期(但し、 収穫150日前まで)	4回以内	4回以内		
						収穫90日前まで	2回以内
わらび	ナガゼンマイハバチ						
いちご	アブラムシ類	2000倍	収穫前日まで				
オリーブ(葉)	オリーブアナアキゾウムシ	50倍	0.3～3L/樹	収穫120日前まで	3回以内	樹幹散布	3回以内
たらのぎ	センノカミキリ幼虫 ヒメシロコブゾウムシ	100倍	150～300L/10a	3月～5月(株養成期)	2回以内		2回以内

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
たらのき	センノガミキリ幼虫 ヒメシロコブゾウムシ	100倍	150～300L/10a	3月～5月(株養成期)	2回以内	樹幹散布	2回以内
セネガ	アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
かんきつ(みかんを除く)		1000～2000倍	200～700L/10a				3回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	サンホーゼカイガラムシ カメムシ類 ミカンキジラミ ケシキスイ類 カネタタキ コアオハナムゲリ アザミウマ類 フラハラゾウムシ ハマキムシ類 コナカイガラムシ類 ミカンツボミタマハエ	1000倍					
みかん	アブラムシ類	1000～2000倍		5回以内	5回以内(但し、樹幹処理は1回以内)		
	サンホーゼカイガラムシ カメムシ類 ミカンキジラミ ケシキスイ類 カネタタキ コアオハナムゲリ アザミウマ類 フラハラゾウムシ ハマキムシ類 コナカイガラムシ類 ミカンツボミタマハエ	1000倍					

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
みかん	サンホセカイガラムシ カメムシ類 ミカンキンラムシ ケンキスイ類 カネタキ コアオハナムケリ アザミウマ類 フタバラジウムシ ハマキムシ類 コナカイガラムシ類 ミカンツボミタマバエ	1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	ケンキスイ類 コアオハナムケリ アザミウマ類	10倍	5L/10a			無人航空機による散布	
なし(有袋栽培)	アブラムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	6回以内	散布	6回以内
	カメムシ類 ナシゲンハイ ハマキムシ類 ナシチビガ ナシホリガ シンクイムシ類 アメリカシロヒトリ	1000倍					
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
なし(無袋栽培)	アブラムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	6回以内	散布	6回以内
	カメムシ類 ナシゲンハイ ハマキムシ類 ナシチビガ ナシホリガ シンクイムシ類 アメリカシロヒトリ	1000倍					
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
りんご	アブラムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
りんご	ナシゲンバイ ハマキムシ類 モモシクイガ ナシヒメシクイ アメリカシロヒトリ	1000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
おうとう	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内(但し、樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内)
	ナシゲンバイ ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ	1000倍					
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ ナシヒメシクイ(心折防止)	1000～2000倍		収穫3日前まで	6回以内		6回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	クワシロカイガラムシ カメムシ類 ハマキムシ類 モモシクイガ ナシヒメシクイ	1000倍					
	クビアカツヤカミキリ						

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
もも	クビアカツヤカミキリ	1000倍	200～700L/10a	成虫発生初期(但し、収穫3日前まで)	6回以内	散布	6回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	クワコナカイガラムシ	1500倍		収穫3日前まで			
うめ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	クビアカツヤカミキリ			1000倍			
	ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ			収穫14日前まで			
大粒種ぶどう	アブラムシ類 ブドウスカシバ フタテンヒメヨコバイ ブドウトリガ	1000～2000倍		収穫21日前まで			4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)
	ブドウウラカミキリ キンケクチブトゾウムシ成虫 ハマキムシ類	1000倍					
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
小粒種ぶどう	アブラムシ類 ブドウスカシバ フタテンヒメヨコバイ ブドウトリガ	1000～2000倍		収穫90日前まで			
	ブドウウラカミキリ キンケクチブトゾウムシ成虫 ハマキムシ類	1000倍					

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
小粒種ぶどう	クワコカイガラムシ	1500倍	200～700L/10a	収穫90日前まで	2回以内	散布	4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)
オリブ	オリブ アナキゾウムシ	50倍	0.3～3L/樹	収穫21日前まで	3回以内	樹幹散布	3回以内
いちょう(種子)	コウモリガ ヒメボクトリ	100倍		収穫60日前まで			
かき	イガ類 カメムシ類 ハマキムシ類 ミノガ類若齢幼虫 オワタコカイガラムシ フジコカイガラムシ カキホリガ カキノハタムシガ アメリカシロヒトリ	1000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで		散布	3回以内(但し、樹幹処理は2回以内)
くり	モモゴマダラノメイガ	8倍	3L/10a	収穫14日前まで	4回以内	空中散布	4回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
花き類・観葉植物	ハダマシ類 アザミウマ類 ハマキムシ類 アオムシ	1000倍	100～300L/10a	-	6回以内	散布	6回以内
アスター	ウリハムシ						
カーネーション	アザミウマ類 クロウリハムシ						

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
カーネーション	アザミウマ類 クオウリハムシ	1000倍	100～300L/10a	-	6回以内	散布	6回以内
ききょう	ヨトウムシ						
きく	アブラムシ類	1000～2000倍					
	カメムシ類 フラバラゾウムシ ヨトウムシ類	1000倍					
シネリア	シンクイムシ類						
宿根かすみそう	ハモグリバエ類						
スターチス	コガネムシ類						
ソリダゴ	カメムシ類						
ばら	アブラムシ類	1000～2000倍					
	フラバラゾウムシ	1000倍					
斑入りアマトゴロ	コウモリガ						
りんどう	ヒラスハナアザミウマ			発生初期			
樹木類	アブラムシ類 ゲンバイムシ類 フラバラゾウムシ		200～700L/10a	-			
	オオハリセンチュウ	500倍	-	移植前	1回	30分間根部浸漬	
	アメリカシロヒトリ	500～1000倍	200～700L/10a	-	6回以内	散布	
しきみ	クスナアキゾウムシ	1000倍					
こでまり	カイガラムシ類						
さかき	ハマキムシ類 サカキゾチヒメコバエ						

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
さかき	ハマキムシ類 サカキゾチメヨコバイ	1000倍	200～700L/10a	-	6回以内	散布	6回以内
にしきぎ	ケムシ類						
さくら	クビアカツヤカミキリ			成虫発生初期			
さんごじゅ	ワタノメイガ			-			
しゃりんばい	シンクイムシ類						
せんりょう	カメムシ類 アザミウマ類						
げっきつ	ミカンジラミ						
つつじ類	ゲンバイムシ類 ハマキムシ類						
だいおうしょう	シンクイムシ類						
芝	コガネムシ類幼虫 シバオサゾウムシ シバツガ スズキリヨウ			3L/平方メートル			
いね科牧草	アブラムシ類 ウカ類 ゾウムシ類 ウリハムシモドキ ヨコバイ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	ムキタニ アワヨトウ	1000倍					
まめ科牧草	アブラムシ類 ウカ類 ゾウムシ類 ウリハムシモドキ ヨコバイ類	1000～2000倍					

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2025年2月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
まめ科牧草	アブラムシ類 ウカ類 ゾウムシ類 ウリハムシトビキ ヨコバエ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ムギダニ	1000倍					
飼料用とうもろこし	アブラムシ類	2000倍		収穫30日前まで			
茶	コクモンハマキ チャホリガ	700～1000倍	200～400L/10a	摘採21日前まで	1回		1回
	ミノガ類	1000倍					
桑	クワゾウムシ成虫	500～750倍	100～300L/10a	成虫発生期	6回以内		6回以内
しちとうい	イネカメムシ	1000倍	60～150L/10a	発生初期	2回以内		2回以内
たばこ	ヨトウムシ		25～180L/10a	収穫20日前まで	1回		1回

適用拡大登録月日：2025年02月10日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

2025年2月10日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数又は 使用量	使用液量	本剤の使用回 数	使用方法	MEPを含む農薬 の総使用回数
水田作物、畑作物（休 耕田）	ヨシ、オギ、ススキ、 セイヨカワヂリ等の多年 生雑草が優 占している 休耕田	カメシ類	1000倍	60～150L/10a	4回以内	散布	4回以内

 適用拡大登録月日：2025年02月10日