

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名        | 適用害虫名                           | 使用量       | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法                                | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数   |
|------------|---------------------------------|-----------|----------|---------|-------------------------------------|---|
| 未成熟とうもろこし  | アノメカ <sup>g</sup>               | 4～6kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内    | 散布                                  | 2回以内  |
|            | ネリムシ類                           | 6kg/10a   | 出芽時      | 1回      | 土壌表面散布                              |   |
| とうもろこし(子実) | アノメカ <sup>g</sup>               | 4～6kg/10a | 収穫60日前まで | 2回以内    | 散布                                  | 2回以内  |
|            | ネリムシ類                           | 6kg/10a   | 出芽時      | 1回      | 土壌表面散布                              |   |
| かんしょ       | ケラ<br>ネリムシ類                     | 4～6kg/10a | 植付前      | 3回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      | 3回以内(但し、マイカ <sup>o</sup> セル剤の植付前の処理は1回以内、マイカ <sup>o</sup> セル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内) |
|            | コガネムシ類幼虫                        |           | 収穫30日前まで |         | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |   |
| ばれいしょ      | ケラ<br>ネリムシ類                     |           | 植付前      | 1回      | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      | 3回以内(但し、植付前の土壌混和は1回以内)  |
| かぶ         | キスジノミムシ                         | 6kg/10a   | 収穫45日前まで | 2回以内    | は種時:作条散布、作物生育中:株元散布                 | 2回以内(但し、生育期は1回以内)   |
|            | ネリムシ類                           |           | 出芽時      |         | 1回                                  |   |
| ごぼう        |                                 | 4kg/10a   | は種時      |         | 全面土壌混和                              | 1回  |
| だいこん       | ケラ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネリムシ類<br>タネバエ | 4～6kg/10a |          |         | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      | 2回以内(但し、生育期は1回以内)   |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名     | 適用害虫名                            | 使用量       | 使用時期                  | 本剤の使用回数 | 使用方法                                | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数                 |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| だいこん    | クラ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネキリムシ類<br>タネバエ | 4～6kg/10a | は種時                   | 1回      | 全面土壌混和又は<br>作条土壌混和                  | 2回以内(但し、<br>生育期は1回以<br>内)         |
|         | キスジノミハムシ                         | 6kg/10a   | は種時及び生育期(但し、収穫21日前まで) | 2回以内    | は種時:作条土壌混和、作物生育中:株元土壌混和             |                                   |
|         | ネキリムシ類                           |           | 生育期(但し、収穫21日前まで)      | 1回      | 土壌表面散布                              |                                   |
|         | ヒメタネイロバエ                         |           | は種時                   |         | 作条土壌混和                              |                                   |
| にんじん    | ネキリムシ類                           |           | は種前                   |         | 全面土壌混和                              | 2回以内(但し、は種前及びは種時は合計1回以内、生育期は1回以内) |
| はつかだいこん | クラ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネキリムシ類<br>タネバエ | 4～6kg/10a | は種時                   |         | 全面土壌混和又は<br>作条土壌混和                  | 2回以内(但し、<br>生育期は1回以<br>内)         |
|         | キスジノミハムシ                         | 6kg/10a   | は種時及び生育期(但し、収穫21日前まで) | 2回以内    | は種時:作条土壌混和、作物生育中:株元土壌混和             |                                   |
|         | ネキリムシ類                           |           | 生育期(但し、収穫21日前まで)      | 1回      | 土壌表面散布                              |                                   |
| もりあざみ   |                                  |           | は種時                   |         |                                     | 1回                                |
| たまねぎ    | クラ<br>コオロギ<br>タマシバエ<br>タネバエ      | 3～5kg/10a | は種時又は定植時              | 2回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 2回以内                              |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名       | 適用害虫名                       | 使用量       | 使用時期       | 本剤の使用回数 | 使用方法                                | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数                    |
|-----------|-----------------------------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| たまねぎ      | ケラ<br>コオキ<br>タマネギバエ<br>タネバエ | 3～5kg/10a | は種時又は定植時   | 2回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 2回以内                                 |
|           | コガネシジミ類幼虫                   | 4～6kg/10a | 収穫30日前まで   |         |                                     |                                      |
|           | タマネギバエ<br>タネバエ              | 6kg/10a   | 土壌表面散布     |         |                                     |                                      |
| 葉たまねぎ     | ケラ<br>コオキ<br>タマネギバエ<br>タネバエ | 3～5kg/10a | は種時<br>定植時 | 1回      | 全面土壌混和                              | 2回以内(但し、は種時の土壌混和は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内) |
|           | コガネシジミ類幼虫                   | 4～6kg/10a | は種時<br>定植時 |         |                                     |                                      |
|           | 食用ゆり                        | コバネキノコバエ類 | 6kg/10a    |         |                                     |                                      |
| 葉にんにく     | ネリムシ類                       | 9kg/10a   | 植付前        | 1回      | 全面土壌混和                              | 1回                                   |
| らっきょう     | ネニ類                         | 6kg/10a   | 収穫21日前まで   | 2回以内    | 散布                                  | 2回以内                                 |
| あさつき      | コガネシジミ類幼虫                   | 4～6kg/10a | は種時又は定植時   |         | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      |                                      |
| にら        | ネリムシ類                       | 5kg/10a   | 定植時        | 1回      | 作条土壌混和                              | 1回                                   |
| ねぎ<br>わけぎ | コガネシジミ類幼虫                   | 4～6kg/10a | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      | 2回以内                                 |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名                                | 適用害虫名   | 使用量       | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法                                | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数                          |
|------------------------------------|---|-----------|----------|---------|-------------------------------------|--|
| ねぎ<br>わけぎ                          | コガネシジミ類幼虫                                       | 4～6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      | 2回以内                                       |
|                                    |   |           | 収穫60日前まで | 3回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |  |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く) | タネバエ  | 4kg/10a   | は種時      | 1回      | 作条土壌混和                              | 4回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は3回以内)                 |
|                                    | コガネシジミ類幼虫                                       | 4～6kg/10a | 収穫60日前まで | 4回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |  |
| あずき                                | コガネシジミ類幼虫                                       | 4～6kg/10a | 収穫60日前まで | 4回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 4回以内(但し、種子粉衣は1回以内、は種時の処理は1回以内、生育期の処理は3回以内) |
|                                    | タネバエ  | 4kg/10a   | は種時      | 1回      | 作条土壌混和                              |  |
| いんげんまめ                             | コガネシジミ類幼虫                                       | 4～6kg/10a | 収穫60日前まで | 2回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 3回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内)                 |
|                                    | タネバエ  | 4kg/10a   | は種時      | 1回      | 作条土壌混和                              |  |
| だいず                                | カメシジミ類<br>シロイチモジ<br>マダラメイガ<br>マメシジミ<br>ダイズサヤマバエ | 4～6kg/10a | 収穫30日前まで | 4回以内    | 散布                                  | 6回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は5回以内(生育期の処理は4回以内))    |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名                              | 適用害虫名                                       | 使用量       | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法           | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数                       |                                     |
|----------------------------------|---|-----------|----------|---------|----------------|---|-------------------------------------|
| だいず                              | カメシ類<br>シロイチモジ マダラメイガ<br>マメシクイガ<br>ダイズサヤマバエ | 4～6kg/10a | 収穫30日前まで | 4回以内    | 散布             | 6回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は5回以内(生育期の処理は4回以内)) |                                     |
|                                  | コガネシ類幼虫<br>タネバエ                             |           |          | 5回以内    |                |   | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
|                                  | フタスジヒメハムシ                                   | 6kg/10a   |          | 4回以内    |                |   | 散布                                  |
|                                  | ネキリシ類                                       |           |          | 5回以内    |                |   | 土壌表面散布                              |
| らっかせい                            | コガネシ類幼虫                                     | 4～5kg/10a | は種前      | 1回      | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 1回                                      |                                     |
|                                  | タネバエ  | 4kg/10a   |          |         | 作条土壌混和         |   |                                     |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く) | コガネシ類幼虫                                     | 4～6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 3回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内)              |                                     |
|                                  | タネバエ  | 4kg/10a   | は種時      | 1回      | 作条土壌混和         |   |                                     |
| えだまめ                             | カメシ類<br>シロイチモジ マダラメイガ<br>マメシクイガ<br>ダイズサヤマバエ | 4～6kg/10a | 収穫30日前まで | 4回以内    | 散布             | 6回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は5回以内(生育期の処理は4回以内)) |                                     |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名    | 適用害虫名                                       | 使用量       | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法           | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数   |
|--------|---|-----------|----------|---------|----------------|---|
| えだまめ   | カメムシ類<br>シロイチモジマダラメイガ<br>マメシクイガ<br>ダイズサヤタバエ | 4～6kg/10a | 収穫30日前まで | 4回以内    | 散布             | 6回以内(但し、<br>種子粉衣は1回<br>以内、粒剤は5回<br>以内(生育期の<br>処理は4回以内)<br>) |
|        | コガネムシ類幼虫<br>タネバエ                            |           |          | 5回以内    |                |   |
|        | フタスジヒメハムシ                                   | 6kg/10a   |          | 4回以内    | 散布             |   |
|        | ネキリムシ類                                      |           |          | 5回以内    | 土壌表面散布         |   |
| さやえんどう | コガネムシ類幼虫                                    | 4～6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 6回以内(但し、<br>種子粉衣は1回<br>以内、粒剤は2回<br>以内、乳剤は3回<br>以内)          |
|        | タネバエ  | 4kg/10a   | は種時      | 1回      | 作条土壌混和         |   |
| 実えんどう  | コガネムシ類幼虫                                    | 4～6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 6回以内(但し、<br>種子粉衣は1回<br>以内、粒剤は2回<br>以内、乳剤は3回<br>以内)          |
|        | タネバエ  | 4kg/10a   | は種時      | 1回      | 作条土壌混和         |   |
| きゅうり   | クワ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネキリムシ類<br>タネバエ            | 4～6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 2回以内  |
| にがうり   | コガネムシ類<br>ネキリムシ類<br>タネバエ                    | 6kg/10a   |          |         |                |   |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名  | 適用害虫名    | 使用量       | 使用時期       | 本剤の使用回数 | 使用方法                                | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数       |
|------|----------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|-------------------------|
| かぼちゃ | クワネキリムシ類 | 4～6kg/10a | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      | 4回以内(但し、粒剤の生育期の処理は3回以内) |
|      | コガネムシ類幼虫 |           | 収穫21日前まで   | 4回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |                         |
| すいか  | クワネキリムシ類 | 4～6kg/10a | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      |                         |
|      | コガネムシ類幼虫 |           | 収穫14日前まで   | 4回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |                         |
| メロン  | クワネキリムシ類 | 4～6kg/10a | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      |                         |
|      | コガネムシ類幼虫 |           | 収穫14日前まで   | 4回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |                         |
| トマト  | クワネキリムシ類 | 4～6kg/10a | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      | 3回以内(但し、生育期は2回以内)       |
|      | コガネムシ類幼虫 |           | 収穫開始10日前まで | 3回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |                         |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名   | 適用害虫名    | 使用量       | 使用時期       | 本剤の使用回数 | 使用方法                                | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数           |
|-------|----------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|
| トマト   | コガネムシ類幼虫 | 4～6kg/10a | 収穫開始10日前まで | 3回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 3回以内(但し、生育期は2回以内)           |
|       | クワネキリムシ類 |           | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      |                             |
| ミニトマト | コガネムシ類幼虫 | 4～6kg/10a | 収穫前日まで     | 3回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 3回以内(但し、<br>粒剤の生育期の処理は2回以内) |
|       | クワネキリムシ類 |           | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      |                             |
| なす    | コガネムシ類幼虫 | 4～6kg/10a | 収穫開始3日前まで  | 3回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 3回以内(但し、<br>粒剤の生育期の処理は2回以内) |
|       | クワネキリムシ類 |           | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      |                             |
| ピーマン  | コガネムシ類幼虫 | 4～6kg/10a | 収穫開始10日前まで | 3回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 3回以内(但し、<br>生育期は2回以内)       |
|       | クワネキリムシ類 |           | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                      |                             |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名    | 適用害虫名    | 使用量       | 使用時期       | 本剤の使用回数 | 使用方法                                    | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数       |
|--------|----------|-----------|------------|---------|---|-------------------------|
| ピーマン   | コガネムシ類幼虫 | 4～6kg/10a | 収穫開始10日前まで | 3回以内    | 作付前:全面土壌混和<br>又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 3回以内(但し、生育期は2回以内)       |
| とうがらし類 | クワネキリムシ類 |           | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                          |                         |
|        | コガネムシ類幼虫 |           | 収穫開始14日前まで | 3回以内    | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土     |                         |
| カリフラワー | クワネキリムシ類 |           | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                          | 2回以内(但し、粒剤の生育期の処理は1回以内) |
|        | コガネムシ類幼虫 |           | 収穫30日前まで   |         | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土     |                         |
|        | ネキリムシ類   | 6kg/10a   | 定植時        | 1回      | 土壌表面散布                                  |                         |
| ブロッコリー | クワネキリムシ類 | 4～6kg/10a | は種時又は定植時   | 2回以内    | 全面土壌混和又は作条土壌混和                          |                         |
|        | コガネムシ類幼虫 |           | 収穫30日前まで   |         | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土     |                         |
|        | ネキリムシ類   | 6kg/10a   | 定植時        | 1回      | 土壌表面散布                                  |                         |
| はこべ    |          |           | は種時        |         | 全面土壌混和                                  | 1回                      |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名                                       | 適用害虫名                      | 使用量     | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法   | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数 |
|---|----------------------------|---------|----------|---------|--------|-------------------|
| モロヘイヤ                                     | ネキリムシ類                     | 6kg/10a | 定植時      | 1回      | 土壌表面散布 | 1回                |
| 非結球あぶらな科葉菜類<br>(こまつな、みずな、ケル、<br>ひろしまなを除く) | ケラ<br>キスジノミハムシ             |         | は種時      |         | 全面土壌混和 |                   |
|   | ネキリムシ類                     |         | は種時又は定植時 |         |        |                   |
| こまつな                                      | ケラ<br>キスジノミハムシ             |         | は種時      |         | 土壌表面散布 |                   |
|   | ネキリムシ類                     |         | 出芽時      |         |        |                   |
| なずな                                       | ネキリムシ類                     |         | は種時又は定植時 |         | 全面土壌混和 |                   |
|   |                            | は種時     |          |         |        |                   |
| 畑わさび                                      | ワサビクダアザミウマ<br>ワサビルイロサルゾウムシ | 3kg/10a | 収穫75日前まで | 2回以内    | 散布     | 2回以内              |
| みずな                                       | ケラ                         | 6kg/10a | は種時      | 1回      | 全面土壌混和 | 1回                |
|   | キスジノミハムシ<br>ネキリムシ類         |         | は種時又は定植時 |         |        |                   |
|   | ネキリムシ類                     |         | 出芽時      |         |        |                   |
| なばな類(はなっこりー、なばな<br>を除く)                   | ケラ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネキリムシ類   | ネキリムシ類  | は種時      | 全面土壌混和  |        |                   |
| なばな                                       | ネキリムシ類                     |         | 定植時      |         |        |                   |
| はなっこりー                                    | ケラ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネキリムシ類   |         | は種時      |         |        |                   |
| ひろしまな                                     | ケラ<br>キスジノミハムシ             | 6kg/10a | 定植時      | 作条土壌混和  |        |                   |
|   | ダイコンハムシ                    |         | 定植時      |         |        |                   |
|   | ネキリムシ類                     |         | は種時又は定植時 |         |        |                   |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名     | 適用害虫名                    | 使用量       | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法  | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数             |
|---------|--------------------------|-----------|----------|---------|---|-------------------------------|
| キャベツ    | クワ<br>ネキリムシ類             | 4～6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内    | 全面土壌混和又は<br>作条土壌混和                          | 2回以内                          |
|         | コガネムシ類幼虫                 |           | 収穫30日前まで |         | 作付前:全面土壌混和<br>又は作条土壌混和<br>、作物生育中:作条処理して軽く覆土 |                               |
|         | ネキリムシ類<br>タネバエ           | 6kg/10a   | 定植時      | 1回      | 土壌表面散布<br>全面土壌混和                            |                               |
| はくさい    | クワ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネキリムシ類 | 4kg/10a   | は種時又は定植時 |         | 全面土壌混和又は<br>作条土壌混和                          | 1回                            |
|         | ネキリムシ類                   | 6kg/10a   | 定植時      |         | 土壌表面散布                                      |                               |
| みつば     | タネバエ                     |           | は種前      |         | 全面土壌混和                                      |                               |
| レタス     | クワ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネキリムシ類 | 4～6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内    | 全面土壌混和又は<br>作条土壌混和                          | 2回以内                          |
|         | ネキリムシ類                   | 6kg/10a   |          |         | 土壌表面散布                                      |                               |
| 非結球レタス  | クワ<br>コガネムシ類幼虫<br>ネキリムシ類 |           |          |         | 全面土壌混和又は<br>作条土壌混和                          |                               |
| こおにたびらこ | ネキリムシ類                   |           | は種時      | 1回      | 全面土壌混和                                      | 1回                            |
| ははこぐさ   |                          |           | は種時又は定植時 |         |   |                               |
| ほうれんそう  | タネバエ                     |           | は種時      |         | 作条土壌混和又は<br>土壌表面散布                          | 2回以内(但し、は種時及びは種前の土壌混和は合計1回以内) |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名       | 適用害虫名    | 使用量       | 使用時期                     | 本剤の使用回数 | 使用方法               | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数                         |
|-----------|----------|-----------|--------------------------|---------|--------------------|---|
| ほうれんそう    | タバエ      | 6kg/10a   | は種時                      | 1回      | 作条土壌混和又は<br>土壌表面散布 | 2回以内(但し、<br>は種時及びは種<br>前の土壌混和は<br>合計1回以内) |
|           | ヒメクロムシカ  |           | は種前                      |         | 土壌混和               |   |
| ふき        | フキアブラムシ  | 4kg/10a   | 収穫30日前まで                 | 3回以内    | 株元散布               | 3回以内                                      |
| いちご       | コガネムシ類幼虫 | 4～6kg/10a | 定植時(本圃)                  | 1回      | 土壌混和               | 2回以内                                      |
|           |          |           | 植付時(仮植床)                 |         |                    |   |
| okra      | ネリムシ類    | 6kg/10a   | 収穫開始30日前まで               | 2回以内    | 土壌表面散布             | 2回以内(但し、<br>萌芽前は1回以<br>内、萌芽後は1回<br>以内)    |
| たらのき      |          |           | 種根定植後～萌芽<br>前            | 1回      |                    |   |
|           |          |           | 種根定植後(但し、萌<br>芽後～萌芽後30日) |         |                    |   |
| ふき(ふきのとう) | フキアブラムシ  | 4kg/10a   | 萌芽前(但し、収穫1<br>50日前まで)    | 2回以内    | 株元散布               | 2回以内                                      |
| ヤングコーン    | ネリムシ類    | 6kg/10a   | 出芽時                      | 1回      | 土壌表面散布             | 1回  |
| ブルーベリー    | コガネムシ類幼虫 |           | 収穫14日前まで                 | 2回以内    | 株元土壌混和             | 2回以内                                      |
| ゆり        | コガネムシ類   |           | 植付後                      | 1回      |                    |   |

適用拡大登録月日：2024年06月12日

# ダイアジノン粒剤5（ダイアジノン粒剤）

適用害虫と使用方法

2024年6月12日現在

| 作物名                             | 適用害虫名                         | 使用量       | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法   | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数          |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|---------|--------|----------------------------|
| ゆり                              | カバネコバエ類                       | 6kg/10a   | 植付時      | 1回      | 作条土壌混和 | 2回以内(但し、植付時は1回以内、植付後は1回以内) |
| 芝                               | コガネシジメ類幼虫                     | 9kg/10a   | 発生初期     | 4回以内    | 散布     | 4回以内                       |
|                                 | シバオサザウムシ成虫<br>シバツトガ<br>スジキリヨウ | 6～9kg/10a |          |         |        |                            |
| 飼料用とうもろこし(青刈り)<br>飼料用とうもろこし(子実) | タマヤガ                          | 6kg/10a   | 収穫60日前まで | 2回以内    |        | 2回以内                       |
| 飼料用とうもろこし(子実)                   | ネリムシ類                         |           | 出芽時      | 1回      | 土壌表面散布 |                            |
| ごま                              |                               |           | は種前      |         |        | 全面土壌混和                     |
| さとうきび                           | ハリガネシ                         |           | 定植時      |         | 土壌混和   | 2回以内                       |
| 桑                               | ハリガネシ                         |           |          |         | 植溝土壌混和 | 1回                         |

適用拡大登録月日：2024年06月12日