

各位

全3ページ

登録速報(2021-223)
2021年10月27日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部 普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2021年10月27日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第 23205 号
名称 フルターボ箱粒剤

2. 変更の内容

農薬登録申請書第6項「農薬の適用病虫害の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更する。

- ・作物名「稲（箱育苗）」に使用量「高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）」を追加する。

【変更後】

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クワアジンを含む農薬の総使用回数	クロラントリプロールを含む農薬の総使用回数	イソシアニルを含む農薬の総使用回数	フラメピルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) ウカ類 ツマグロコハイ イネミスリウムシ イネトオイムシ ニカメイチュウ イネツトムシ フタバヒコヤガ イネヒマモクリハエ コブノメイガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植 3日前 ～ 移植 当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する。	4回以内 (移植時 までの 処理は 1回以内、 本田での 散布、 空中散布、 無人航空機 散布は 合計 3回以内)	1回	3回以内 (移植時 までの 処理は 1回以内、 本田では 2回以内)	2回以内 (移植時 までの 処理は 1回以内)
	<u>高密度に は種する 場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)</u>								

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

農薬登録申請書第7項「農薬の使用上の注意事項」に(2)として以下を追加し、現行(2)以降を順次繰り下げ、別紙のとおりとする。

【追加事項】

- (2) 育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当りに乾粒として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整すること。

別紙

【変更後】

7. 農薬の使用上の注意事項

- (1) 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植すること。
- (2) 育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当りに乾籾として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整すること。
- (3) 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意すること。
- (4) 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきは丁寧に行い、移植後田面が露出しないように注意すること。
- (5) いぐさ栽培予定水田では使用しないこと。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないこと。
- (6) きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布すること。
また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけること。
- (7) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上