

各位

全3ページ  
登録速報(2023-079)  
2023年 2月22日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。  
適用拡大登録年月日：2023年2月22日

## 記

### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第22798号

名称：クミアイコルト顆粒水和剤

### 2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項を以下のとおり変更し、【変更後】のとおりとする。

#### (1) 適用病害虫名の追加

- ・茶(マダラカサハラハムシ)／2000倍、散布

#### (2) 使用方法の追加

- ・かんきつ／16倍(4L/10a)、20倍(5L/10a)、40倍(10L/10a)、無人航空機による散布
- ・はくさい、レタス、非結球レタス／24倍(1.6L/10a)、30倍(2L/10a)、48倍(3.2L/10a)、無人航空機による散布
- ・ねぎ／16倍(1.6L/10a)、20倍(2L/10a)、32倍(3.2L/10a)、無人航空機による散布
- ・チューリップ／40～120倍(3L/10a)、無人航空機による散布

#### (3) 希釈倍数の追加

- ・キャベツ／20倍(2L/10a)、32倍(3.2L/10a)、無人航空機による散布
- ・ブロッコリー／32倍(2L/10a)、50倍(3.2L/10a)、無人航空機による散布
- ・てんさい／40倍(2L/10a)、64倍(3.2L/10a)、無人航空機による散布

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

| 作物名                              | 適用病害虫名                | 希釈倍数       | 使用液量            | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法              | ピリフルキザンを含む農薬の総使用回数 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------|---------|-------------------|--------------------|
| <u>かんきつ</u>                      | アブラムシ類                | <u>16倍</u> | <u>4L/10a</u>   | 収穫前日まで  | 3回以内    | <u>無人航空機による散布</u> | 3回以内               |
|                                  |                       | <u>20倍</u> | <u>5L/10a</u>   |         |         |                   |                    |
|                                  |                       | <u>40倍</u> | <u>10L/10a</u>  |         |         |                   |                    |
|                                  | アカルカイガラムシ             | 2000倍      | 200～700L/10a    |         |         | 散布                |                    |
|                                  | カイガラムシ類（アカルカイガラムシを除く） | 2000～3000倍 |                 |         |         |                   |                    |
| チャノキイロアザミウマ<br>コナジラミ類<br>ミカンバエ成虫 | 3000倍                 |            |                 |         |         |                   |                    |
| アブラムシ類                           | 4000倍                 |            |                 |         |         |                   |                    |
| <u>てんさい</u>                      | アブラムシ類                | 32倍        | 1.6L/10a        | 収穫7日前まで | 3回以内    | <u>無人航空機による散布</u> | 3回以内               |
|                                  |                       | <u>40倍</u> | <u>2L/10a</u>   |         |         |                   |                    |
|                                  |                       | <u>64倍</u> | <u>3.2L/10a</u> |         |         | 散布                |                    |
|                                  |                       | 4000～6000倍 | 100～300L/10a    |         |         |                   |                    |

| 作物名                 | 適用病害虫名   | 希釈倍数           | 使用液量            | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法              | ピリフルキザンを含む農薬の総使用回数 |                   |      |
|---------------------|--|----------------|-----------------|---------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| <u>キャベツ</u>         | アブラムシ類   | 16倍            | 1.6L/10a        | 収穫前日まで  | 3回以内    | <u>無人航空機による散布</u> | 3回以内               |                   |      |
|                     |  | <u>20倍</u>     | <u>2L/10a</u>   |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | <u>32倍</u>     | <u>3.2L/10a</u> |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     | 3000～4000倍   | 100～300L/10a   | 散布              |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     | 袈裟アザミウマ  | 3000倍          |                 |         |         |                   |                    |                   |      |
| <u>ブロッコリー</u>       | アブラムシ類   | 25倍            | 1.6L/10a        | 収穫前日まで  |         | 3回以内              |                    | <u>無人航空機による散布</u> | 3回以内 |
|                     |  | <u>32倍</u>     | <u>2L/10a</u>   |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | <u>50倍</u>     | <u>3.2L/10a</u> |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | 4000倍          | 100～300L/10a    |         | 散布      |                   |                    |                   |      |
| <u>はくさい</u>         | アブラムシ類   | 24倍            | 1.6L/10a        | 収穫3日前まで | 3回以内    |                   | <u>無人航空機による散布</u>  | 3回以内              |      |
|                     |  | <u>30倍</u>     | <u>2L/10a</u>   |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | <u>48倍</u>     | <u>3.2L/10a</u> |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | 4000倍          | 100～300L/10a    |         |         |                   | 散布                 |                   |      |
| <u>レタス</u>          | アブラムシ類   | 24倍            | 1.6L/10a        | 収穫前日まで  |         | 3回以内              | <u>無人航空機による散布</u>  |                   | 3回以内 |
|                     |  | <u>30倍</u>     | <u>2L/10a</u>   |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | <u>48倍</u>     | <u>3.2L/10a</u> |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | 3000～4000倍     | 100～300L/10a    |         |         |                   | 散布                 |                   |      |
| <u>非結球レタス</u>       | アブラムシ類   | 24倍            | 1.6L/10a        | 収穫7日前まで | 3回以内    |                   | <u>無人航空機による散布</u>  | 3回以内              |      |
|                     |  | <u>30倍</u>     | <u>2L/10a</u>   |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | <u>48倍</u>     | <u>3.2L/10a</u> |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | 3000～4000倍     | 100～300L/10a    |         |         |                   | 散布                 |                   |      |
| <u>ねぎ</u>           | アブラムシ類<br>袈裟アザミウマ<br>袈裟ハモグリバエ                      | 16倍            | 1.6L/10a        | 収穫3日前まで |         | 3回以内              | <u>無人航空機による散布</u>  |                   | 3回以内 |
|                     |  | <u>20倍</u>     | <u>2L/10a</u>   |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | <u>32倍</u>     | <u>3.2L/10a</u> |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     |  | 2000倍          | 100～300L/10a    |         |         |                   | 散布                 |                   |      |
| <u>茶</u>            | クワシロカイガラムシ   | 2000～3000倍     | 1000L/10a       | 摘採7日前まで | 2回以内    |                   | 散布                 | 2回以内              |      |
|                     | チャノミドリヒメコハバイ<br>チャノキイロアザミウマ<br>チャトゲコナジラミ<br>アブラムシ類 |                | 200～400L/10a    |         |         |                   |                    |                   |      |
|                     | ツマゲロアオカスミカメ<br><u>マダラカサハラハムシ</u>                   |                | <u>2000倍</u>    |         |         |                   |                    |                   |      |
| <u>チューリップ</u>       | アブラムシ類   | <u>40～120倍</u> | <u>3L/10a</u>   | 発生初期    | 4回以内    |                   | 散布                 | 4回以内              |      |
| 花き類・観葉植物（チューリップを除く） | アブラムシ類<br>コナジラミ類                                   | 4000倍          | 100～300L/10a    |         |         |                   |                    |                   |      |

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容なし

以上