

登 録 速 報

農 薬 名： ヤイバ1キロ粒剤（登録番号：第 23063 号）

適用拡大登録月日：平成25年8月7日

適用拡大登録内容：

- ①使用方法「湛水散布」、適用地帯「東北、北陸、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期「移植直後」に、適用土壌「砂壤土」を追加する。
- ②使用方法「田植同時散布機で施用」の適用地帯「東北、北陸、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」に、適用土壌「砂壤土」を追加する。

（変更後）全内容

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|---------|------|---|---|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ | 移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで | 砂壤土～埴土 | 1kg /10a | 1回 | 湛水散布 | 東北、北陸、近畿・ 中国・四国の 普通期及び 早期栽培地帯 | |
| | | | 埴土～埴土 | | | | 北海道、関東・ 東山・東海、 九州の普通期 及び早期栽培地帯 | |
| | 移植時 | 砂壤土 | 砂壤土～埴土 | | | | 田植同時 散布機で 施用 | 東北、北陸、近畿・ 中国・四国の 普通期及び 早期栽培地帯 |
| | | 埴土～埴土 | | | | | | 北海道、関東・ 東山・東海、 九州の普通期及び 早期栽培地帯 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| ピリミルファンを含む 農薬の総使用回数 | フェントラザミドを含む 農薬の総使用回数 |
| 2回以内 | 1回 |

注意事項の変更：

[変更前]

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ミズガヤツリは3葉期まで、ウリカワ、ヘラオモダカは2葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。

[変更後]

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ(北海道は2葉期まで)、ミズガヤツリ(東北、北陸は2葉期まで)、ヘラオモダカ(北海道は2葉期まで)は3葉期まで、ウリカワは2葉期まで、ミズアオイは1葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。

以 上