

登 録 速 報

農 薬 名：クマイイガスタード微粒剤（登録番号：第 17719 号）

適用拡大登録月日：平成26年5月28日

適用拡大登録内容：

- 作物名「葉たまねぎ(苗床)（一年生雑草）」を追加する。

【追加事項】追加作物のみ

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダゾメットを含む農薬の総使用回数
葉たまねぎ (苗床)	一年生 雑草	10～ 20kg/10a	は種 14 日前 まで	1 回	本剤の所定 量を均一に 散布して浅 く混和する	1 回

注意事項の変更：

【変更前】

- 芝の場合、目土中に含まれる雑草種子を殺す目的で目土を処理するものであるので除草剤として、芝生に直接散布する事のないように注意すること。
- たまねぎに使用する場合、次のことに注意すること。
 - は種 14 日前までに使用する場合、本剤を均一に散布後、レーキ等で浅く（2～3cm）混和し、ビニール等で被覆する。7日後に被覆を除去し、さらにその後7日間放置し、は種前にレーキ等で浅く整地によるガス抜きを行うこと。
 - 秋期に使用する場合、本剤を均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆する。約20日後に被覆を除去してガス抜きを行うこと。は種は翌春に行うこと。

【変更後】

- 芝の目土に処理する場合は、目土中に含まれる雑草種子を殺す目的で目土を処理するものであるので除草剤として、芝生に直接散布する事のないように注意すること。
- 葉たまねぎ(苗床)及びたまねぎのは種 14 日前までに使用する場合、本剤を均一に散布後、レーキ等で浅く（2～3cm）混和し、ビニール等で被覆する。7日後に被覆を除去し、さらにその後7日間放置し、は種前にレーキ等で浅く整地によるガス抜きを行うこと。
- たまねぎに秋期に使用する場合、本剤を均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆する。約20日後に被覆を除去してガス抜きを行うこと。は種は翌春に行うこと。

以 上