

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイ トップジンM水和剤（登録番号：第11574号）

適用拡大登録月日：平成26年6月25日

適用拡大登録内容：

- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」とする。
- 作物名「小麦」の適用病害虫名「雪腐大粒菌核病」の希釈倍数「500倍」に「250倍」を追加し「250～500倍」とする。
- 作物名「トマト」についての拡大申請記載を申請者の都合により削除する。

【変更後】変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	珒ファネートメチルを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	8回以内 (塗布は3回以内、散布は5回以内)
小麦	雪腐病	2000～2500倍	60～150L/10a	根雪前	3回以内(出穂期以降は2回以内)		4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)
	雪腐大粒菌核病	1000倍					
		250～500倍	25L/10a				
	赤かび病	250倍					
	うどんこ病	1000～1500倍	60～150L/10a	収穫14日前まで			
眼紋病	2000倍	1000倍					

注意事項の変更：

【変更前】

- かんしょ、さといもの種いも消毒後は水洗せずに薬液が乾いてから植付けること。薬液処理した種いもは食用、飼料に使用しないこと。

【変更後】

- かんしょ、さといもの種いも消毒後は水洗せずに薬液が乾いてから植付けること。薬剤処理した種いもは食用、飼料に使用しないこと。

以 上