

登 録 速 報

農 薬 名：ボデーガードジャンボ（登録番号：第 22617 号）

バイエルクロップサイエンス(株)登録

適用拡大登録月日：平成26年7月23日

適用拡大登録内容：

- 直播水稻を追加する

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ クログワイ (北海道を除く) オモダカ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ (北海道) コウキヤガラ (九州) シズイ (東北)	移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 ただし、 移植後 30 日まで	砂壤土 ～ 埴土	小包装 (パック) 10 個 (400g)/10a	1 回	水田に小包装 (パック)の まま投げ 入れる。	全域 の普通期 及び早期 栽培地帯
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 ただし、 収穫 90 日前まで	壤土～ 埴土				全域

テフルトリオンを含む 農薬の総使用回数	フェントザミドを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	1 回

注意事項の変更：

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、田植え5日後からノビエの2.5葉期までに、直播水稻については稲1葉期からノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生始期までが本剤の散布適期である。クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。
- 直播水稻に使用する場合は、薬害を避けるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用は避けること。

以 上