

## 登 録 速 報

農 薬 名：ボデーガードフロアブル（登録番号：第 22616 号）

バイエルクロップサイエンス(株)登録

適用拡大登録月日：平成26年7月23日

適用拡大登録内容：

- 直播水稻を追加する

**【変更後】**

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ クログワイ (北海道を除く) オモダカ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ (北海道) コウキヤガラ (関東・ 東山・東海、九州) シズイ (東北)	移植後5日～ ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日 まで	砂壤土～ 埴土	500mL/ 10a	1回	原液 湛水 散布 又は 水口 施用	全域の普通期及び 早期栽培地帯
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ ノビエ3葉期 ただし、 収穫90日前 まで	壤土～ 埴土			原液 湛水 散布	全域

テフトリカを含む 農薬の総使用回数	フェントザミドを含む 農薬の総使用回数
2回以内	1回

注意事項の変更：

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、移植水稻については田植え5日後からノビエの3葉期までに、直播水稻については稲1葉期からノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヘラオモダカ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生始期が本剤の散布適期である。クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは、十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。
- 直播水稻に使用する場合は、薬害を避けるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用は避けること。

以 上