

登 録 速 報

農 薬 名：ヒエクリーン1キロ粒剤（登録番号：第 20499 号）

適用拡大登録月日：平成27年8月26日

適用拡大登録内容：

- 適用土壌、適用地帯の区分を廃止する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピリミバクメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻		移植後 15 日～ ノイ4 葉期 但し、収穫 45 日前まで	1kg/10a	1 回	湛水散布	2 回以内
		稲 3 葉期～ノイ4 葉期 但し、収穫 45 日前まで		1 回		
直播水稻	ノイ	は種時	0.5kg/10a (少量散布)	1 回	は種同時散布機で 施用	
			1kg/10a			
		は種直後	0.5kg/10a (少量散布)		落水散布又は ごく浅く湛水して 散布	
		は種直後～稲出芽前	1kg/10a			

注意事項の変更：

【削除】

- 河川、湖沼、地下水等を汚染しないよう、落水、かけ流しはしないこと。

【変更後】

- 苗の植付けが均一となるように、代かきおよび植付作業はていねいにおこなうこと。未熟有機物を使用した場合は、特にていねいにおこなうこと。
- 以下のような条件下では薬害の生じるおそれがあるので使用をさけること。
 - 略
- 直播水稻に使用する場合は以下に注意すること。
 - 稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさけること。
 - 稲の出芽後から3葉期末までは薬害を生じるおそれがあるので使用をさけること。
 - 略
- 梅雨時期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下するおそれがあるので使用はさけること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上