

登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農 薬 名：ガンガンジャンボ（登録番号：第 23536 号）

適用拡大登録月日：平成28年11月16日

適用拡大登録内容：

- 作物名「直播水稻」を追加する。
- 作物名「移植水稻」に適用雑草名「シズイ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用 回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホトライ ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ アオイトロ・藻類による 表層はく離	移植後3日～ ルビエ2.5葉期 但し、移植後30日 まで	小包装 (パック) 10個(250g) /10a	1回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる。
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホトライ ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ルビエ2.5葉期 但し、収穫60日前 まで			

ピリミスファンを含む農薬の総使用回数	フェノキサリホンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2. 5葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカは2葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないなので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。

【追加事項】

- 直播水稻に使用する場合、以下の点に注意すること。
 - 発芽直後の稲に対して薬害を生じるおそれがあるので、適切な覆土をおこない、稲の1葉期以降に散布すること。
 - 稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさけること。
 - 除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、入水後水持ちの安定した後に散布すること。

以 上