

平成29年7月12日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農薬名：アトリ豆つぶ250（登録番号：第23843号）

適用拡大登録月日：平成29年7月12日

適用拡大登録内容：

- 作物名「移植水稻」の使用時期「移植後20日（稲5葉期以降）～収穫45日前まで」を「移植後20日（稲5葉期以降）～ヒエ4葉期 但し、収穫45日前まで」に変更する。
- 作物名「移植水稻」の使用方法「湛水散布」を「湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布」に変更する。
- 作物名「移植水稻」に適用雑草名「ヒエ、コウキガウ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピリミルファンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ヒエ ミスガヤツリ ウリカ ヒムシロ セリ オモダカ クログワイ シスイ コウキガウ	移植後20日 （稲5葉期以降） ～ヒエ4葉期 但し、 収穫45日前まで	250g/10a	1回	湛水散布 又は 無人ヘリ コプター による 散布	2回以内

注意事項の変更：

【追加部分】

- 無人ヘリコプターで散布する際は以下に注意すること。
 - 散布は使用機種の使用基準に従って実施する。
 - 専用の粒剤散布装置によって湛水散布する。
 - 事前に薬剤の物理性に合せて粒剤散布装置のメタリング開度を調整する。
 - 散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、圃場の端から5m以上離して圃場内に散布する。
 - 水源池、飲料用水などに飛散、流入しないように十分注意する。

【変更前】

- 生育期に入った雑草に効果があるが、雑草の生育段階によって効果に振れが出るので、必ず適期に散布すること。ミズガヤツリは6葉期まで、ウリカワは4葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカでは発生盛期から矢尻葉3葉期まで、クログワイ、シズイでは草丈30cm以下が本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、シズイに有効な前処理剤との組み合わせで使用することにより、より高い効果が得られる。

【変更後】

- 本剤はノビエの4葉期までに有効なので、時期を失ないように散布すること。なお、生育期に入った雑草に効果があるが、多年生雑草は生育段階によって効果に振れが出るので、必ず適期に散布すること。ミズガヤツリは7葉期まで、ウリカワは5葉期まで、ヒルムシロは発生盛期まで、セリは再生期まで、オモダカでは発生盛期から矢尻葉3葉期まで、クログワイ、シズイ、コウキヤガラでは草丈30cm以下が本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラに有効な前処理剤との組み合わせで使用することにより、より高い効果が得られる。

以上