

サプロール乳剤（トリホリン乳剤）

適用病害と使用方法

2023年11月22日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリホリンを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	さび病	800～1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内	
さやえんどう	うどんこ病	1500倍			3回以内		3回以内	
きゅうり		1000～2000倍			5回以内		5回以内	
メロン		2000倍			6回以内		6回以内	
トマト		葉かび病			1000倍		3回以内	3回以内
なす	うどんこ病	1000～2000倍			5回以内		5回以内	
ピーマン		1000倍			3回以内		3回以内	
しそ	さび病	2000倍			収穫3日前まで		2回以内	2回以内
食用ぎく	白さび病				収穫14日前まで		5回以内	5回以内
いちご	うどんこ病				収穫前日まで			
もも	灰星病	800～1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	4回以内		
かき	うどんこ病	1000倍						
花き類・観葉植物（ばら、きくを除く）			100～300L/10a	発病初期	5回以内	5回以内		
きく	白さび病	1000～1500倍						
ばら	うどんこ病 黒星病	1000倍						
芝	さび病	1～2L/平方メートル					6回以内	6回以内
西洋芝（ベントグラス） 日本芝	フェアリーリング病	10L/平方メートル						

適用拡大登録月日：2023年11月22日