

サターンバアロ粒剤（プロメトリン・ベンチオカーブ粒剤）

適用雑草と使用方法

2019年9月11日現在

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロメトリンを含む農薬の総使用回数 | ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数 |
|------|---------------|-------------------------------|-----------|---------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 直播水稻 | マツバイ 一年生雑草 | は種直後～稲出芽前（ルビ発生始期まで）（入水15日前まで） | 4～6kg/10a | 1回 | 乾田・落水状態で全面土壌散布 | 1回 | 2回以内（但し、入水前は1回以内、入水後は1回以内） |
| 小麦 | 一年生雑草 | は種後～出芽前（雑草発生前） | 3～6kg/10a | | 全面土壌散布 | 2回以内 | 1回 |
| | | 生育初期（小麦の4葉期まで、スズメテッポウ1.5葉期まで） | 3～5kg/10a | | | | |
| 大麦 | | 生育初期（大麦の4葉期まで、スズメテッポウ1.5葉期まで） | | | | | |
| | | は種後～出芽前（雑草発生前） | | | | | |

サターンバアロ粒剤（プロメトリン・ベンチオカーブ粒剤）

適用雑草と使用方法

2019年9月11日現在

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロメトリンを含む農薬の総使用回数 | ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数 | | |
|--------------|-------|-------------------|-----------|---------|--------|-------------------|--------------------|------|------|
| とうもろこし | 一年生雑草 | は種直後 | 4～6kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | | |
| たまねぎ | | 定植直後（雑草発生始期まで） | | | | | | | |
| にんじん | | は種直後（雑草発生前） | 4～5kg/10a | | | 2回以内 | | | |
| ねぎ | | 定植直後（雑草発生始期まで） | | | | 1回 | | | |
| つつじ類 つばき類 | | 植付後（雑草発生前） | 4～6kg/10a | | | 3回以内 | | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | | は種後～出芽前（雑草発生前） | 5～6kg/10a | | | 1回 | | 1回 | 1回 |
| らっかせい | | 春期発芽前又は夏切後（雑草発生前） | | | | 2回以内 | | 2回以内 | 2回以内 |
| 桑 | | | | | | | | | |