

各位

全 3 ページ
登録速報(2021-147)
2021年 6月 9日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2021年6月9日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

| | |
|------|-----------------|
| 登録番号 | 第 18563 号 |
| 名 称 | クミアイアドマイヤーフロアブル |

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、次の事項を変更し、別紙【変更後】のとおりとする。

- ・作物名「キャベツ」、「はくさい」、「ブロッコリー」、「レタス」及び「非結球レタス」に使用方法「無人航空機による散布」（適用病害虫名：アブラムシ類）を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」のイミダクロプリドを含む農薬の総使用回数を「4回以内(育苗期の灌注は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内)」に変更する。
- ・作物名「キャベツ」、「はくさい」及び「レタス」のイミダクロプリドを含む農薬の総使用回数を「3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内)」に変更する。
- ・作物名「だいこん」のイミダクロプリドを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、は種後の処理は2回以内)」に変更する。
- ・作物名「れんこん」のイミダクロプリドを含む農薬の総使用回数を「3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内)」に変更する。

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

該当無し。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ミダコフリンを含む農薬の総使用回数 |
|---------------|---------------|-------|--------------|----------|---------|-------------------|---|
| <u>キャベツ</u> | <u>アブラムシ類</u> | 4000倍 | 100～300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | <u>3回以内</u> (<u>定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内</u>) |
| | | 32倍 | 1.6～2L/10a | | | <u>無人航空機による散布</u> | |
| | | 150倍 | 4～5L/10a | | | | |
| <u>はくさい</u> | <u>アブラムシ類</u> | 4000倍 | 100～300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | <u>3回以内</u> (<u>定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内</u>) |
| | | 32倍 | 1.6～2L/10a | | | <u>無人航空機による散布</u> | |
| | | 150倍 | 4～5L/10a | | | | |
| <u>ブロッコリー</u> | <u>アブラムシ類</u> | 2000倍 | 100～300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | <u>4回以内</u> (<u>育苗期の灌注は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内</u>) |
| | | 24倍 | 1.6～2L/10a | | | <u>無人航空機による散布</u> | |
| | | 80倍 | 4～5L/10a | | | | |
| <u>レタス</u> | <u>アブラムシ類</u> | 4000倍 | 100～300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | <u>3回以内</u> (<u>定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内</u>) |
| | | 40倍 | 1.6～2L/10a | | | <u>無人航空機による散布</u> | |
| | | 150倍 | 4～5L/10a | | | | |
| <u>非結球レタス</u> | <u>アブラムシ類</u> | 4000倍 | 100～300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| | | 32倍 | 1.6～2L/10a | | | <u>無人航空機による散布</u> | |
| | | 150倍 | 4～5L/10a | | | | |
| <u>だいこん</u> | <u>アブラムシ類</u> | 4000倍 | 100～300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | <u>3回以内</u> (<u>は種時の土壌混和は1回以内、は種後の処理は2回以内</u>) |
| <u>れんこん</u> | <u>アブラムシ類</u> | 4000倍 | 100～300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | <u>3回以内</u> (<u>植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内</u>) |

以上