

登 録 速 報

農 薬 名：ポデーガードフロアブル（登録番号：第 22616 号）

適用拡大登録月日：平成25年6月26日

適用拡大登録内容：

適用雑草名「コウキヤガラ（関東・東山・東海、九州）」及び「シズイ（東北）」を追加する。

（変更後）全内容

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ヘラオモダカ(北海道、東北) ミズガヤツリ(北海道を除く) ウリカワ クログワイ(北海道を除く) オモダカ、ヒルムシロ、セリ エゾノサヤヌカグサ(北海道) コウキヤガラ(関東・東山・東海、九州) シズイ(東北)	移植後 5 日～ ノビエ 3 葉期 ただし、 移植後 30 日 まで	砂壤土～ 埴土	500ml/ 10a	1 回	原液 湛水散布 又は 水口施用	全域の 普通期及び 早期栽培地帯

テフルトリオンを含む 農薬の総使用回数	フェントラザミドを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	1 回

注 意 事 項 の 変 更：以下の項目に「コウキヤガラ」「シズイ」を追加。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、田植え5日後からノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイは3葉期まで、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生始期が本剤の散布適期である。クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは、十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

以 上