

登 録 速 報

農 薬 名：ベンレート水和剤（登録番号：第 20889 号）住友化学(株)登録

適用拡大登録月日：平成25年8月28日

適用拡大登録内容：

- ①作物名「なたね」を追加する。
- ②作物名「稲」の適用病害名「いもち病」に使用方法「種子吹き付け処理」を追加する。
- ③作物名「ねぎ」の本剤の使用回数「2回以内(本圃定植後は1回以内)」を「1回」に変更し、ペノミルを含む農薬の総使用回数「3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内(本圃定植後は1回以内))」を「3回以内(種子粉衣は1回以内、苗根部浸漬及び灌注は合計1回以内、散布は1回以内)」に変更する。
- ④作物名「ねぎ」の適用病害名「小菌核腐敗病」に使用方法「灌注」を追加する。
- ⑤作物名「だいず」に適用病害名「黒根腐病」使用方法「種子粉衣」を追加する。
- ⑥作物名「はくさい」の希釈倍数「2000倍」を「2000～3000倍」に変更する。
- ⑦作物名「なし」の適用病害名「心腐れ症(胴枯病菌)」の希釈倍数「3000倍」を「2000～3000倍」に変更する。
- ⑧作物名「らっかせい」の希釈倍数「2000～3000倍」に適用病害名「黒渋病」を追加する。

(変更後) 変更作物のみ

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペノミルを含む農薬の総使用回数
稲	ばか苗病 いもち病 イネシガレセンチュウ	乾燥種粒重の0.5～1.0%	-	は種前 (浸種前又は浸種後)	1回	種子粉衣	2回以内 (種子への処理は1回以内、床土への混和は1回以内)
	ばか苗病 いもち病	30～50倍				10分間種子浸漬	
	イネシガレセンチュウ	30倍				6～24時間種子浸漬	
	ばか苗病	500～1000倍				12～24時間種子浸漬	
	いもち病	7.5～15倍	乾燥種粒 1kg 当り希釈液 30ml			種子吹き付け処理	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペニルを含む農薬の総使用回数
なし	胴枯病	2000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	6 回以内 (塗布は 2 回以 内、散布は 4 回以 内)
	輪紋病 黒星病 うどんこ病 心腐れ症(胴枯病 菌)	2000～ 3000 倍					
ねぎ	枝枯病 胴枯病	20 倍	-	3 月～6 月	2 回以内	マシン油乳剤で希 釈し塗布	3 回以内 (種子粉衣は 1 回 以内、苗根部浸 漬及び灌注は合 計 1 回以内、散 布は 1 回以内)
	萎凋病 小菌核腐敗病	100～ 200 倍		定植直前	1 回	5 分間苗根部 浸漬	
	萎凋病	500 倍	セル成型育苗ト レイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊(30×60cm、 使用土壌約 5L)当り 500ml			定植前	
	小菌核腐敗病			1000～ 2000 倍	収穫 30 日前 まで		
だいず	菌核病 紫斑病	乾燥種子 重量の 0.5%	100～300 L/10a	収穫前日 まで	4 回以内	種子粉衣	5 回以内 (種子粉衣は 1 回 以内、は種後は 4 回以内)
	黒根腐病		-	は種前	1 回		
らっかせい	褐斑病 黒渋病	2000～ 3000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前ま で	4 回以内	散布	3 回以内 (種子粉衣は 1 回 以内、は種後は 2 回以内)
	そうか病	2000 倍					
はくさい	白斑病	2000～ 3000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前ま で	2 回以内	散布	2 回以内
なたね	菌核病	1000～ 2000 倍		収穫 3 日前ま で			

注意事項の変更：

[変更前]

- 常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウス内を開放し、十分換気した後に入室すること。

[変更後]

- 常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。

以上