

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイベフトップジンフロアブル（登録番号：第 21863 号）

適用拡大登録月日：平成26年6月25日

適用拡大登録内容：

- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の使用時期を「収穫前日まで」に変更する。

【変更前】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ミノクジンを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
かんきつ (みかん を除く)	貯蔵病害 (青かび病、 緑かび病、 軸腐病、 こうじかび 病、 黒腐病、 炭疽病)	1500 倍	200～700 L/10a	収穫 7日 前ま で	2回 以内	散 布	2回以内	8回以内 (塗布は 3回以内、 散布は 5回以内)
みかん					3回 以内		3回以内	8回以内(塗 布は3回以 内、散布、空 中散布及び無 人ヘリ散布は合 計5回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ミノクジン を含む 農薬の総 使用回数	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
かんきつ (みかん を除く)	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(こうじか び病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(炭疽病)	1500 倍	200～ 700 L/10a	収穫前日 まで	2回 以内	散 布	2回以内	8回以内 (塗布は 3回以内、 散布は 5回以内)
みかん				収穫7日 前まで	3回 以内		3回以内	8回以内(塗 布は3回以 内、散布、空 中散布及び無 人ヘリ散布は合 計5回以内)

注意事項の変更：なし

以上