

## 登 録 速 報

農 薬 名：キクトモ1キロ粒剤（登録番号：第 23335 号）

適用拡大登録月日：平成26年7月23日

適用拡大登録内容：

- 使用方法「湛水散布」及び「田植同時散布機で施用」の適用地帯「近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯」に適用土壌「砂壤土」を追加する。
- 適用雑草名「ウリカワ(九州)」を「ウリカワ(北陸、近畿・中国・四国、九州)」に変更する。
- 適用雑草名「アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海)」を「アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸、関東・東山・東海)」に変更する。

### 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ (北陸、近畿・中国・四国、九州)	移植直後～ ノビエ2.5葉期但し、移植後30日まで	砂壤土～ 埴土	1kg /10a	1回	湛水散布	関東・東山・東海、 近畿・中国・四国、 九州の普通期及び 早期栽培地帯
			埴土～ 埴土				北陸
	ミズガヤツリ ヒルムシロ アオミドロ・藻類 による表層はく離 (北陸、関東・東山・東海)	移植時	砂壤土～ 埴土			田植同時 散布機 で施用	関東・東山・東海、 近畿・中国・四国、 九州の普通期及び 早期栽培地帯
			埴土～ 埴土				北陸

カフェンストロールを含む農薬の総使用回数	ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数
1回	2回以内	3回以内 (育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内

注意事項の変更：

### 【変更前】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失し

ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ミズガヤツリ（北陸は発生始期まで）、ウリカワは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生始期が本剤の散布適期である。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2. 5葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ミズガヤツリ（北陸は発生始期まで）、ウリカワ（北陸、近畿・中国・四国は発生始期まで）は2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離（北陸は発生前）は発生始期までが本剤の散布適期である。

以 上