

# 登 録 速 報

農 薬 名 : クミアイダコニール1000 (登録番号 : 第 16824 号)

適用拡大登録月日 : 平成27年6月24日

適用拡大登録内容 :

- 作物名に「オクラ」を追加する。
- 作物名「いちじく」の適用病害虫名に「黒かび病」を追加する。
- 作物名「たまねぎ」の適用病害虫名に「白色疫病」を追加する。
- 作物名「茶」の「希釈倍数 700 倍」の適用病害虫名に「灰色かび病」を追加する。
- 作物名「セルリー」の適用病害虫名に「萎縮炭疽病」を追加する。
- 作物名「キャベツ」の適用病害虫名に「根朽病」を追加する。

【変更後】（変更作物のみ）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPN を含む農薬の総使用回数
いちじく	疫病 黒葉枯病 黒かび病	2000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内
オクラ	葉すす病	1000 倍	100～300 L/10a		5 回以内		5 回以内
キャベツ	べと病 根朽病			収穫 14 日前 まで	2 回以内		3 回以内 （は種又は 定植前の土壌 混和は 1 回 以内、散布及 びエアゾル剤の 噴射は合計 2 回以内）
たまねぎ	べと病 灰色かび病 白色疫病			収穫 7 日前 まで	6 回以内		6 回以内
セルリー	斑点病 萎縮炭疽病			収穫 21 日前 まで	2 回以内		2 回以内
茶	炭疽病 もち病 輪斑病	700～ 1000 倍	200～400 L/10a	摘採 10 日前 まで	1 回		1 回
	網もち病 褐色円星病	1000 倍					
	新梢枯死症 （輪斑病菌による） 黒葉腐病 灰色かび病	700 倍					

注意事項の変更：なし

以上