

登 録 速 報

農 薬 名：ヒエクリーン豆つぶ250（登録番号：第 22586号）

適用拡大登録月日：平成27年7月22日

適用拡大登録内容：

- 作物名「直播水稻」の使用時期「休3葉期～バ¹3葉期 但し、収穫45日前まで」を「稲3葉期～バ¹3葉期 但し、収穫45日前まで」に変更する。
- 適用土壌、適用地帯の区分を廃止する。

【変更前】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミバ ¹ ックメ ¹ ルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	バ ¹ エ	移植後15日～バ ¹ エ4葉期 但し、 収穫45日前まで	砂壤土～埴土	250g/10a	1回	湛水散布 又は 湛水周縁散布	全域 (九州を除く) の普通期及び 早期栽培地帯	2回以内
			壤土～埴土				九州の 普通期及び 早期栽培地帯	
直播水稻	バ ¹ エ	休5葉期～バ ¹ エ3葉期 但し、 収穫45日前まで	砂壤土	250g/10a	1回	湛水散布	全域 (九州を除く)	2回以内
			壤土～埴土					

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ピリミバ ¹ ックメ ¹ ルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	バ ¹ エ	移植後15日～バ ¹ エ4葉期 但し、収穫45日前まで	250g/10a	1回	湛水散布又は 湛水周縁散布	2回以内
直播水稻		稲3葉期～バ ¹ エ3葉期 但し、収穫45日前まで			湛水散布	

注意事項の変更：

【削除事項】

- 河川、湖沼、地下水等を汚染しないよう、落水、かけ流しはしないこと。

【変更後】

- 苗の植付けが均一となるように、代かきおよび植付作業はていねいにおこなうこと。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなうこと。
- 藻類・表層はく離などの水面浮遊物が多い場合は、本剤の拡散が不十分になるおそれがあるため、周縁散布をさけ、本田内で、水田全面に散布すること。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけること。
○略
- 梅雨時期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下するおそれがあるので使用をさけること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上