

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農薬名：ベルコートフロアブル（登録番号：第 19884 号）（日本曹達(株)登録）

適用拡大登録月日：平成29年1月11日

適用拡大登録内容：作物名「かぼちゃ」及び「チューリップ」を追加する。

【変更後】追加作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	うどんこ病	1000 倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4 回以内	散布	4 回以内
チューリップ ^o	褐色斑点病	1000 倍	100～300L/10a	発生初期	8 回以内	散布	8 回以内

注意事項の変更：

【変更後】

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲で使用すること。
- 0℃以下では増粘あるいは固化により容器から取り出しにくくなることがあるので、室温(25℃)～50℃で3時間程度保存し、流動性が回復した後によく振ってから使用すること。
- 本剤をおうとうに使用する場合、着色期の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないこと。
- りんごの落花直後から落花後25日ごろまではさび果を生じるおそれがあるので、かからないように注意すること。
- 西洋なしの品種ルレクチエではさび果を生じるので使用しないこと。
- 缶桃14号等の缶詰用品種のももでは葉に薬斑を生じるので、かからないように注意すること。
- かきの品種西村早生では葉に薬斑を生じるおそれがあるので、かからないように注意すること。
- 幼果期のメロン、ばらに対して薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意すること。

- やまのいも(むかご)に使用する場合、種いも(やまのいも)を浸漬処理すること。
- 本剤をチューリップに使用する場合、花卉に薬害が生じるおそれがあるので、出蕾期以前に使用すること。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意すること。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 無人ヘリコプターによる散布を行う場合には、次の注意事項を遵守すること。
 - 散布機種 of 散布基準に従って行うこと。
 - 散布機種に適合した散布装置を使用すること。

以 上