

平成29年7月12日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農薬名：ヤブサメジャンボ（登録番号：第23819号）

適用拡大登録月日：平成29年7月12日

適用拡大登録内容：

- 作物名「移植水稻」に適用雑草名「アミドロ・藻類による表層はく離」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバ ホトメ ウリカ ミスガヤツリ ヘラモダカ ヒムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ アミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ヒエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (250g) /10a	1回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる。

ピラコニルを含む農薬の総使用回数	ピリミスファンを含む農薬の総使用回数	フェキサスルホンを 含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

注意事項の変更：

【変更前】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリは2葉期まで、ホタルイは3葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ヘラオモダカ、ウリカワは2葉期まで、ホタルイ、ミズガヤツリは3葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。

以上