



水田多年生雑草防除剤

バサグラン[®]

粒剤 (ナトリウム塩)
液剤 (ナトリウム塩)

難防除雑草に 困って いませんか?

クログワイ、オモダカ、シズイ、
コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ等の
難防除雑草には、
バサグラン粒剤・液剤がおすすめです。
もちろん、近年問題となっている抵抗性の
ホタルイやアメリカアゼナ等にも
優れた効果を発揮します。
雑草の発生を見てから散布できる
ので、使いやすい除草剤です。

水田多年生 雑草防除剤

バサグラン[®] 粒剤 (ナトリウム塩) 液剤 (ナトリウム塩)

■農林水産省登録：(粒剤)第16123号
(液剤)第16130号

■有効成分：ベンタゾン (粒剤)11.0%
(液剤)40.0%

■人畜毒性：普通物※

※毒劇物に該当しないものを指している通称

難防除雑草に優れた効果

一年生雑草はもちろん多年生雑草も防除します。特にクログワイ、オモダカ、シズイなど「難防除雑草」に高い効果を発揮します。

生育期の雑草に高い効果

生育期の雑草に高い殺草効果を発揮します。雑草の発生を見てから使えますので、むだがありません。

広い散布適期

散布適期の幅が広いので防除適期を逃すことがなく、確実に除草することができます。

バサグラン粒剤

平成29年7月の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノサヤヌカグサ シズイ	移植後15～55日 但し 収穫60日前まで	3～4kg/10a	1回	落水散布又は ごく浅く湛水して散布	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	稲3葉期～入水50日後 但し 収穫60日前まで	3kg/10a			

バサグラン液剤

平成29年7月の登録内容


作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム	移植後15～55日 但し 収穫50日前まで	500～700 mℓ/10a	70～100 ℓ/10a	2回以内	落水散布又は ごく浅く湛水して散布	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後35～50日 但し 収穫50日前まで					

※液剤は水稻の他、たまねぎ、らっきょう、いんげんまめ、べにばないんげん、えんどうまめ、実えんどう、さやえんどう、とうもろこし、飼料用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、はとむぎ、せりにも登録があります。

上手な使い方

●落水処理に注意

落水またはできるだけ浅水状態にしてください。
散布後少なくとも3日間(浅水処理は5日間)は
そのままの状態を保ち、入水しないでください。
散布後7日間は落水、
かけ流しはせず、
散布後降雨があっても落水
しないでください。




●雑草の増殖初期までに散布

散布適期はホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から発生前期まで(粒剤)発生盛期から増殖初期まで(液剤)、クログワイでは草丈15cm以下(粒剤)15～30cm(液剤)、エゾノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30cm、コウキヤガラでは増殖期(液剤)、クサネムでは本葉展開期(液剤)です。

●体系除草

イネ科雑草には効果がありませんので、イネ科雑草に効果のある初期除草剤、中期除草剤または一発除草剤との組み合わせによる体系除草を行ってください。



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。