




# ポデーガード®

2成分。  
白く枯らして、  
稲を守る。



ポデーガードは頼れる水稲用一発除草剤。  
2成分で、しぶとい雑草にも有効。  
白く枯れるから、効果がひと目でわかる。



ポデーガード®はバイエルグループの登録商標 豆つぶ®はクミアイ化学工業(株)の登録商標

## 1キロ粒剤

大型包装  
10kg入り



## フロアブル

大型包装  
2L入り



## ジャンボ

大型包装  
1.2kg入り  
(400g×3袋入り)



## 豆つぶ® 250

大型包装  
2.5kg入り



新登場

- 新規成分テフリルトリオンとフェントラザミドの2種混合の一発処理除草剤です。
- ほとんど全ての水田一年生雑草、多年生雑草に高い効果を示します。オモダカ、クログワイ等の難防除雑草に対しても有効です。
- 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにイボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。
- 約40~50日間の残効が期待でき、通常の圃場条件下では、一回の散布で雑草を防除できます。
- 水稲に対する選択性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。(砂質土壌や漏水田での使用はさけてください)



ノビエ

コナギ

ホタルイ

オモダカ

クログワイ

イボクサ

アシカキ

# 水稲用一発処理除草剤 **ポデーガード**

## 適用雑草と使用方法

(2017年12月現在の登録内容)

### ポデーガード 1キロ粒剤

テフリルトリオン 3.0%、フェントラザミド 3.0% 農林水産省登録：第22612号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	移植時	1kg/ 10a	本剤 1回	田植同時 散布機で 施用
	セリ クログワイ オモダカ エゾノサヤヌカグサ シズイ コウキヤガラ	移植直後～ ノビエ 3葉期 ただし、 移植後 30日まで			
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ	稲1葉期～ ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫 90日前まで		フェントラザミド 1回	湛水散布 又は 無人 ヘリコプター による散布

ごくまれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。砂壌土や早期栽培地帯では、葉害のおそれがあるので、稲の活着を待ってから本剤を処理して下さい。

### ポデーガード ジャンボ

テフリルトリオン 7.5%、フェントラザミド 7.5% 農林水産省登録：第22617号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ コウキヤガラ シズイ	移植後 5日～ ノビエ 2.5葉期 ただし、 移植後 30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)/ 10a	本剤 1回	水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入れる
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫 90日前まで			
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫 90日前まで		フェントラザミド 1回	

ジャンボ剤のパックが固まっている場合は、手で軽くもみほぐしてから投げ入れて下さい。拡散が不十分な場合などに、まれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

### ポデーガード フロアブル

テフリルトリオン 5.8%、フェントラザミド 5.8% 農林水産省登録：第22616号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ コウキヤガラ シズイ	移植後 5日～ ノビエ 3葉期 ただし、 移植後 30日まで	500ml/ 10a	本剤 1回	原液 湛水散布 又は 水口施用 又は 無人 ヘリコプター による滴下
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ ノビエ 3葉期 ただし、 収穫 90日前まで			
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ ノビエ 3葉期 ただし、 収穫 90日前まで		フェントラザミド 1回	原液 湛水散布 又は 無人 ヘリコプター による滴下

本剤が多量に稲体に付着した場合に、付着した葉ならびに直後に伸展してくる新葉1～2枚に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。なお、ノズル散布をした場合、白化症状が強くなる場合があります。

### ポデーガード 豆つぶ250

テフリルトリオン 12.0%、フェントラザミド 12.0% 農林水産省登録：第23723号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ エゾノサヤヌカグサ アオミドロ・ 藻類による 表層はく離	移植後 5日～ ノビエ 2.5葉期 ただし、 移植後 30日まで	250g/ 10a	本剤 1回	湛水散布 又は 湛水 周縁散布 又は 無人 ヘリコプター による散布
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫 90日前まで		フェントラザミド 1回	

ごくまれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

#### 豆つぶ剤の3つの特長

- 1 とにかく軽い**  
10a当たりの使用量は、わずか250g。らくに運ぶことができます。
- 2 田んぼに入らず散布可能**  
拡散性に優れるので、あぜから撒けばしっかり広がる！  
田んぼに入らなくても大丈夫です。
- 3 作業時間が短縮できる**  
30a約3分で散布が可能。作業時間の短縮になります。



ひしゃくを使って  
ラクラク散布

\*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

#### 注意事項(抜粋)

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、移植水稲についてはノビエの2.5葉期(豆つぶ・ジャンボ)～3葉期(1キロ粒剤・フロアブル)までに、直播水稲についてはノビエの2.5葉期(1キロ粒剤・ジャンボ)～3葉期(フロアブル)までに時期を失ないように散布して下さい。
- 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態(水深3～5cm、ジャンボ・豆つぶは5～6cm)で、使用して下さい。
- 散布後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないで下さい。また、入水は静かに行ってください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を使用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 以下の条件では葉害を生じるおそれがあるので使用をさけて下さい。  
①砂質土壌の水田及び漏水水田(減水深2cm/日以上) ②軟弱苗を移植した水田  
③極端な浅植えの水田及び浮き苗の多い水田 ④植穴の戻りの悪い水田(豆つぶの場合のみ)

- 直播水稲に使用する場合は、葉害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用はさけて下さい。
- 本剤を散布した水田の田面水を他の作物に灌水しないで下さい。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分に注意して下さい。
- 無人ヘリコプターで散布する場合(1キロ粒剤・フロアブル剤・豆つぶ)は、使用機種の使用基準に従って実施して下さい。水源池、飲料用水等に本剤が流入しないように十分注意して下さい。フロアブル剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理して下さい。また、本剤の滴下に使用した無人ヘリコプターの散布装置は、水稲以外の作物への薬液散布には使用しないで下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用して下さい。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベル記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。 ●防除日誌を記帳しましょう。