

幅広い  
鋭い切れ味



適用土壌・適用地帯の  
区分がなくなりました。



田植同時処理もできます  
(1キロ粒剤)

水稲用初・中期一発処理除草剤

ヤイバ®

1キロ粒剤

豆つぶ® 250  
ジャンボ

自然に学び自然を守る



®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



# ヤイバ®

- 有効成分：1キロ粒剤 ピリミスルファン…0.50%  
フェントラザミド…3.0%
- 豆つぶ250 シンボ ピリミスルファン…2.0%  
フェントラザミド…12.0%
- 人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

## 特長

- 特別栽培にも使用しやすい2成分の初・中期一発剤です。
- 難防除雑草を含む広範囲の雑草に高い効果があります。
- カヤツリグサ科雑草に卓効を示し、幅広い散布適期を有します。
- 長い抑草期間を有し、安定した効果を示します。
- 田植同時処理もできます(1キロ粒剤)。
- 10アール当り250gと軽量で拡散性に優れた豆つぶ製剤です(豆つぶ250・ジャンボ)。
- フロアブル剤のように、袋のまま散布できます(豆つぶ250)。

## 適用雑草及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法
1 キロ粒剤 第2020002001号登録	移植水稲 水田一年生雑草及びマツバイ ホタルイ、ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ、シズイ オモダカ クログワイ コウキヤガラ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	1kg	1回	湛水散布 または 無人ヘリコプターによる散布
		移植時			田植同時散布機で施用

●各有効成分を含む農業の総使用回数:ピリミスルファン2回以内、フェントラザミド1回

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法
豆つぶ250 第2020002001号登録	移植水稲 水田一年生雑草及びマツバイ ホタルイ、ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ シズイ ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	250g	1回	湛水散布、湛水周縁散布 または 無人ヘリコプターによる散布

●各有効成分を含む農業の総使用回数:ピリミスルファン2回以内、フェントラザミド1回

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法
ジャンボ 第2020002001号登録	移植水稲 水田一年生雑草及びマツバイ ホタルイ、ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (250g)	1回	水田に小包装(パック)の まま投げ入れる

●各有効成分を含む農業の総使用回数:ピリミスルファン2回以内、フェントラザミド1回


## 使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期(豆つぶ250およびジャンボは2.5葉期)までに、時期を失ないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが異なるので、必ず適期に散布してください。  
※散布適期の詳細につきましては製品ラベルでご確認ください。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないため、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせる使用してください。
- 苗の植付が均一となるように、代かきおよび植付作業は遅く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないため、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせる使用してください。
- 未熟有機物を施用した場合は、特に遅い時期におこなってください。
- 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態(水深3～5cm)のまま田面に均一に散布してください(1キロ粒剤)。
- 散布の際は、やや深めの湛水状態(水深5～6cm)にして水の出入りを止めてください(豆つぶ250、ジャンボ)。
- 湛水散布の場合は田面に散布し、また、湛水周縁散布の場合は、水田周縁部に沿って帯状に散布してください(豆つぶ250)。
- 散布後3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かにおこなってください。
- ジャンボ剤は小包装(パック)のまま10アール当たり10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
- 藻類・表層はく離などの水面浮遊物が多い場合は、豆つぶ250では拡散が不十分になるおそれがあるため、周縁散布をさけ、本田内で水田全面に散布してください。ジャンボ剤では拡散が不十分になるおそれがあるため、使用はさけてください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください(ジャンボ)。
- 以下のような条件下では葉害が発生するおそれがあるため使用をさけてください。  
1. 砂質土壌の水田および漏水田(減水深が2cm/日以上)  
2. 軟弱苗を移植した水田  
3. 極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田
- 梅雨時期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下するおそれがあるため使用をさけてください。
- 散布後の数日間に著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがありますが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていません。
- 吸湿性があるので、散布時に降雨の場合には濡れないように注意して散布してください。濡れた手で扱わないでください。また、開封後は早めに使用してください(豆つぶ250)。
- 無人ヘリコプターで散布する際は以下に注意してください。(1キロ粒剤、豆つぶ250)  
○散布は使用機種の使用基準に従って実施してください。  
○専用の粒剤散布装置によって湛水散布してください。  
○事前に薬剤の物理性に合せた粒剤散布装置のメタリング度を調整してください。  
○散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、圃場の端から5m以上離れて圃場内に散布してください。  
○水源地、飲料水などに飛散、流入しないように十分注意してください。
- 散布した水田の田面水を他の作物に灌水しないでください。
- いぐさ、れんこん、せり、くわい等の生育を阻害するおそれがあるため、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分に注意してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

## 上手な使い方

### 標準的な使用時期

雑草生育初期での使用が、より効果的です。



## 安全使用上の注意

- 誤食などのないよう注意してください(豆つぶ250)。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください(1キロ粒剤)。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください(豆つぶ250)。
- 皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください(1キロ粒剤)。
- 水溶性フィルムで小包装化されているため、濡れた手で触らないでください(ジャンボ)。
- 水溶性フィルムが破袋した場合は以下の点に注意してください(ジャンボ)。  
1. 誤食などのないよう注意してください。  
2. 眼に対して刺激性がありますので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください(1キロ粒剤)。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布後は水管理に注意してください。空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください(1キロ粒剤、豆つぶ250)。
- 無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意してください(1キロ粒剤、豆つぶ250)。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2015年8月現在の知見に基づき作成しています。

自然に学び 自然を守る

1179(15-8)