

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 20180 号

登 録 年 月 日 平成29年 4月 19日

農 薬 の 種 類 スピノサド水和剤

農 薬 の 名 称 クミアイスピノエース顆粒水和剤

物 理 的 淡褐色水和性細粒
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の スピノサド 25.0%
種 類 及 び 含 有 量

スピノシンA
(2R, 3aS, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-(6-テオキシ-2, 3, 4-トリ-O-メチル- α -L-マンノピラノシルオキシ)-13-(4-ジメチルアミノ-2, 3, 4, 6-テトラテオキシ- β -D-エリスロピラノシルオキシ)-9-エチル-2, 3, 3a, 5a, 5b, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, 16b-ヘキサデカヒドロ-14-メチル-1H-as-インダセノ[3, 2-d]オキサクロマテン-7, 15-ジオン 21.0%

スピノシンD
(2S, 3aR, 5aS, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bS)-2-(6-テオキシ-2, 3, 4-トリ-O-メチル- α -L-マンノピラノシルオキシ)-13-(4-ジメチルアミノ-2, 3, 4, 6-テトラテオキシ- β -D-エリスロピラノシルオキシ)-9-エチル-2, 3, 3a, 5a, 5b, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, 16b-ヘキサデカヒドロ-4, 14-ジメチル-1H-as-インダセノ[3, 2-d]オキサクロマテン-7, 15-ジオン 4.0%

そ の 他 の 鉍物質微粉、界面活性剤等 75.0%
成 分 の 種 類 及 び 含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 鹿兒島市南栄2-9
名 称 及 び 所 在 地 サンケイ化学㈱鹿兒島工場
群馬県高崎市大八木町888
新富士化成薬㈱高崎工場
北海道滝川市北滝の川1470
北興化学工業㈱北海道工場

小 分 製 造 場 群馬県高崎市小八木町313
新富士化成薬㈱群馬工場

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき 令和 6年 12月 25日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スチロゾルを含む農薬の総使用回数		
いちじく	アザミウマ類	5000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回		
ラズベリー				収穫3日前まで	2回以内		2回以内		
マンゴー	チャイロアザミウマ								
デブハ(葉)	ハシロウツノエグリヒメハマキ	2500～5000倍		収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内		
メキハツ	タナキ、ウワハ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、シロイチモンジヨトウ						4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内)		
	ハイマダラノメイガ、アザミウマ類	5000倍							
はくさい	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ウワハ類	2500～5000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで					
	ヨトウムシ、カブラハバチ類	5000倍							
ブロッコリー	コナガ、アオムシ			収穫7日前まで			3回以内		
カリフラワー	コナガ			収穫14日前まで					
メキハツ	ハスモンヨトウ								
非結球メキハツ	ヨトウムシ								
にんじん(葉)、にんにく、未成熟ふじまめ、未成熟ささげ	アザミウマ類			収穫前日まで			3回以内		
だいこん	コナガ、アオムシ、キスシ、シムシ	2500～5000倍		収穫7日前まで					
はつかだいこん		5000倍							
非結球あぶらな科葉菜類(みずな、非結球はくさいを除く)	アオムシ、コナガ、アザミウマ類、ハメグリハエ類、ヨトウムシ類、ハイマダラノメイガ	2500～5000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内		
非結球はくさい		5000倍		収穫3日前まで	1回		1回		
みずな					3回以内		3回以内		
かぶ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう	ハメグリハエ類								
なす	アザミウマ類	2500～5000倍		収穫前日まで	2回以内	灌注	2回以内		
	オオタバコガ	5000倍							
ピーマン	アザミウマ類								
	オオタバコガ	2500～5000倍							
トマト、ミニトマト	アザミウマ類、オオタバコガ、ハメグリハエ類	5000倍			3回以内		4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内)		
ししとう、甘長とうがらし	アザミウマ類	20000倍							
レタス	オオタバコガ	2500～5000倍		収穫3日前まで	3回以内				
	ヨトウムシ	5000倍							
	ハメグリハエ類	500～1000倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3 L)当り500 mL	定植前まで	1回				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スプレッドを含む農薬の総使用回数		
非結球レタス	ハモグリハエ類	500～1000倍	セル成型育苗トレイ1箱またはベーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3L)当り500mL	定植前まで	1回	灌注	3回以内(定植前は1回以内、本圃では2回以内)		
	材カビコガ	2500～5000倍		収穫7日前まで	2回以内				
	ヨウムシ	5000倍		収穫前日まで					
いちご、いちごとうがね、せり、アスパラガス、いんげんじな、エンサイ	収穫7日前まで			3回以内			3回以内		
きゅうり(葉)	収穫14日前まで								
きゅうり(花)	10000倍			2回以内			2回以内		
きゅうり、メロン	ハモグリハエ類、アザミヤ類、ウリノメイガ	5000倍						3回以内	
ズッキーニ、ズッキーニ(花)	アザミヤ類	5000～10000倍		2回以内			2回以内		
ねぎ、わけぎ、あさつき	シイモジヨトウ	5000倍						3回以内	
にら、にら(花茎)、しよくようほおずき、食用ミナバラ	アザミヤ類	2500～5000倍		収穫3日前まで					
		10000倍		収穫前日まで				2回以内	
らっきょう、つるな		2500倍		収穫3日前まで					
みつば	ハスモンヨトウ	5000倍		収穫7日前まで、ただし、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで				2回以内	
セリ	ハモグリハエ類	2500倍		収穫3日前まで	3回以内				
パセリ	ヨウムシ			収穫14日前まで				2回以内	
モロヘイヤ、さく(葉)	アザミヤ類			収穫3日前まで	3回以内				
クレソン	コガ								
みょうが(花穂)	アザミヤ類	5000倍		収穫前日まで	2回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	2回以内		
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで					
しそ科葉菜類、しそ(花穂)、食用花(かんぞう(花)、食用ぎく、食用ミナバラを除く)				10000倍	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	
さんしょう(葉)	アゲハ	5000倍	1回						1回
よもぎ	アザミヤ類								
にんじん	ハモグリハエ類								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スビノパを含む農薬の総使用回数
ふだんそう	ハスモンヨトリ	4000倍	100～300 Q/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
食用へちま	ハモグリハエ類	5000倍		収穫前日まで			
ほうれんそう	アザミウマ類、アシクロハモグリハエ、シロオビメイガ						
食用ぎく	ミカンキイロアザミウマ	10000倍		収穫3日前まで			
花き類・観葉植物(きくを除く)	アザミウマ類	5000倍		発生初期			
きく	オオハコガ	2500～5000倍					
	アザミウマ類、ハモグリハエ類	5000倍					
樹木類	ケムシ類		200～700 Q/10a				