


予防と治療に優れたラビライトが  
りんごを病害から守ります。



クミアイ

ラビライト®

水和剤



炭疽病



すす点病



すす斑病



輪紋病



黒点病



黒星病



斑点落葉病



うどんこ病



褐斑病



腐らん病




# ラピライト®水和剤

- 有効成分 : チオファネートメチル.....20.0%  
マンネブ.....50.0%
- 毒性 : 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
- 包装 : 500g×20袋


10回以内  
(塗布時葉面温度50℃以内)

## ラピライト

	3月下旬0 (発芽 日前)	発芽 1日後	開花直前	落花期	(落花) 5月中旬10日後	6月上旬頃	6月中旬頃	6月下旬頃	7月上旬頃	7月中下旬頃	8月上旬頃	8月下旬頃	9月上旬頃	9月中下旬頃	11月上旬頃



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2019年1月現在の登録内容に基づいています。



自然に学び 自然を守る 1648(19-1)

**クミアイ化学工業株式会社**  
 本社:東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5036  
 ホームページアドレス http://www.kumiai-chem.co.jp

水稲防除効果検証結果