

自然に学び 自然を守る



フミカ

農林水産省登録 第22102号

水稲用殺虫・殺菌剤

ビームTMモンセレン[®]スタークル[®]粉剤5DL

いもち病



紋枯病



オオトゲシラホシカメムシ



アカヒゲホソミドリカスミカメ



ホンハリカメムシ




セジロウンカ



ツマグロヨコバイ



出穂期の散布で 重要病害虫を同時防除!



TM:ビームはダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シー商標
®:モンセレンはバイエルクロップサイエンス(株)の登録商標
スタークルは三井化学アグロ(株)の登録商標

■特長

- 1.殺虫成分スタークルがウンカ類、ツマグロヨコバイ等に安定した高い効果を発揮し、特に斑点米カメムシには優れた防除効果を示します。
- 2.スタークルの有効成分は速やかに稲体内へ移行し、長い残効性と耐雨性を示します。
- 3.ビームはいもち病に対して、優れた治療効果と予防効果を示します。
- 4.モンセレンは紋枯病の菌糸侵入阻止力・上位進展阻止力が強く安定した効果を示します。


■適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール当り 使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを含む 農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含 む農薬の総使用回数	ペンシクロンを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4kg	収穫 21日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人ヘリ 散布は合計3回以内)	4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、 本田では3回以内)	4回以内

■試験成績


●紋枯病防除効果

2006年 島根県農業技術センター



●斑点米カメムシに対する防除効果

2006年 福井県植物防疫協会



⚠️使用上の注意事項

1. 桑に付着するおそれがある地域では使用しないでください。散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。
2. ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 ○ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 ○養蜂がおこなわれている地区では周辺への飛散に注意するなど、ミツバチの危害防止に努めてください。
3. 野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水など)には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
4. 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
5. 眼に対して刺激性があるので注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
6. 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをするとともに洗眼をしてください。
7. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
8. 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵・乾燥した場所に保管してください。

本資料は2010年12月現在の知見に基づいて作成されております。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記帳しましょう。

0370(10-12)