

星の女神の除草剤

ノビエ・コナギ・ホタルイに高い効果



水稲用初・中期一発処理除草剤

# カスター<sup>®</sup>

フェノキサスルホン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル剤

1キロ粒剤75 豆つぶ<sup>®</sup> 250 ジャンボ フロアブル



「フェノキサスルホン」配合

- ノビエに対し、高い効果と長期残効を示します
- 一年生広葉雑草の後発生を抑えます



®はクミアイ化学工業（株）の登録商標

有効成分

1キロ粒剤75 ●フェノキサスルホン (2.0%), プロモブチド (9.0%), ベンシルフロンメチル (0.75%)  
 豆つぶ250 ●フェノキサスルホン (8.0%), プロモブチド (36.0%), ベンシルフロンメチル (3.0%)  
 ジャンボ ●フェノキサスルホン (8.0%), プロモブチド (36.0%), ベンシルフロンメチル (3.0%)  
 フロアブル ●フェノキサスルホン (3.7%), プロモブチド (16.5%), ベンシルフロンメチル (1.4%)

人畜毒性 普通物 (劇毒物に該当しないものを指していう通称)

- 特長** 「フェノキサスルホン」により2.5葉期までのノビエに卓効を示し、またノビエや一年生広葉雑草(コナギ・アゼナ類)に長期残効を示します。
- プロモブチドを10アールあたり90g配合し、抵抗性イヌホタルイにも安定した効果を示します。
- 4剤型(1キロ粒剤・豆つぶ剤・ジャンボ剤・フロアブル剤)が揃っており、使用方法に合わせてお使いいただけます。

適用雑草及び使用方法

1キロ粒剤75 農林水産省登録第23533号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	1kg	1回※	湛水散布又は 無人航空機による 散布
直播水稲	水田一年生雑草及びホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			

豆つぶ250 農林水産省登録第23538号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	250g	1回※	湛水散布 湛水周縁散布 又は無人航空機 による散布

ジャンボ 農林水産省登録第23540号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装(パック) 10個(250g)	1回※	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる

フロアブル 農林水産省登録第23544号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	500ml	1回※	原液湛水散布

※各有効成分を含む農薬の総使用回数:フェノキサスルホン…2回以内、プロモブチド…2回以内、ベンシルフロンメチル…2回以内

上手な使い方  
(移植水稲)

標準的な  
使用時期



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2019年7月現在の知見に基づいて作成しております。