



悪い虫はおらんか

国宝「風神雷神図屏風」建仁寺蔵

りんご・落葉果樹の害虫防除に

# イカスチ<sup>®</sup>WDG



リンゴコカクモンハマキ



モモシクイガ



キンモンホソガ

りんご・落葉果樹の害虫防除に

# イカズチ<sup>®</sup>WDG

- 優れた殺虫活性** 合成ピレスロイド系の殺虫剤で、主要害虫に対して優れた殺虫活性を示します。
- 優れた残効性** 主要害虫に十分な残効を有し、特にモモシクイガに対し長期の果実侵入阻止効果を有します。
- 使いやすい製剤** 希釈時の粉立ちが少なく、使用者への安全と使いやすさに配慮した製剤です。



## ■適用害虫の範囲および使用方法

有効成分:シベルメトリン…9.0% 医薬用外劇物

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む農薬の総使用回数	
りんご	カメムシ類、シンクイムシ類 ハマキムシ類 キンモンホソガ アブラムシ類 ギンモンハモグリガ ヨモギエダシャク キリガ類 モモチョッキリゾウムシ	1,500	200~700 ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
なし	カメムシ類、シンクイムシ類			3回以内				3回以内
もも	カメムシ類 シンクイムシ類 アブラムシ類 モモハモグリガ アザミウマ類			5回以内				
ネクタリン	シンクイムシ類			2回以内	2回以内			
すもも	アメリカシロヒトリ			2回以内			2回以内	
あんず	アザミウマ類、コガネムシ類 フタテンヒメヨコバイ クビアカスカシバ			5回以内	5回以内			

2019年11月現在の登録内容

## ■試験成績



### ⚠ 使用上の注意事項

- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合してください。
- 害虫に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかけないようにしてください。
  - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の処置を受けさせてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の処置を受けてください。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに洗顔してください。
- 摘果等の作業の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器・空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。 ● 防除日誌を記載しましょう。

1747(19-11)