

各位

全2ページ
登録速報(2020-108)
2020年2月26日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り新規登録となりましたので、ご連絡します。

新規登録年月日： 2020年2月26日

記

1. 農薬の種類及び名称

種類：ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド粉剤

名称：ブレードスタークル粉剤DL

登録番号： 第24347号

2. 農薬の物理的・化学的性状

類白色粉末 45 μ m以下 浮遊性指数 20以下

3. 農薬の有効成分の種類及び含有濃度

(*RS*)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)ゲアニジン……………0.35%

(*Z*)-2'-メチルアセトフェノン-4,6-ジメチルピリミジン-2-イルヒドラゾン……………2.0%

4,5,6,7-テトラクロロフタリド……………1.5%

4. 農薬のその他の成分の種類及び含有濃度 (15に掲げる事項を除く。)

鉱物質微粉等……………96.15%

5. 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3～4kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布

ジネフランを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の総使用回数	アライトを含む農薬の総使用回数
4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は 合計1回以内、 本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計3回以内)	2回以内	3回以内

6. 農薬の使用上の注意事項

- 1) 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布すること。
- 2) たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- 3) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 4) ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
 - ②関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 5) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

7. 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- 1) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- 2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

8. 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

以上