

すぐ効く、よく効く、ながく効く

水稲、野菜、樹木、花きなど、50作物以上に適用



コナジラミ類、シロイチモジヨトウなどの問題害虫に優れた効果を発揮します。




シロイチモジヨトウ



コナジラミ類

自然をみつめる殺虫剤



クミアイ

トレボン® 乳剤

有効成分：エトフェンブロックス・・・20.0%



トビイロウンカ



セジロウンカ



イネミスソウムシ



カメムシ



コブノメイガ

トレボンは三井化学アグロ(株)の登録商標です。

自然をみつめる
殺虫剤



農林水産省登録 第17168号

人畜毒性：普通物※

※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

特長

- ① 水稻のウンカ・ヨコバイ類に安定した効果
- ② 幅広い作物の主要害虫に優れた効果
- ③ 優れた速効性と残効性
- ④ 抵抗性害虫にも有効
- ⑤ 作物を守る特異な忌避作用

使用上の注意

●水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので、十分注意してください。

●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

①ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。

②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

●本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。

●本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

蚕毒に関する注意

●蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には、絶対に桑葉にからさないようにしてください。

●散布器具・作業衣等は桑用と必ず区別してください。

■適用害虫および使用方法

*本剤およびエトフェンブロックスを含む農薬の総使用回数

作物名・適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	コブノメイガ	1000倍	60~150ℓ	収穫14日前まで	3回以内	
	ツマグロヨコバイ、ウンカ類、イネドロオイムシ、イナゴ類	1000~2000倍				
	カメムシ類、イネミスジゾウムシ	2000倍				
	ウンカ類	300~600倍				
	ツマグロヨコバイ、イネミスジゾウムシ、イネドロオイムシ	300倍				
水田作物、畑作物(休耕田)※	カメムシ類	2000倍	60~150ℓ	—		
ブロッコリー	アオムシ	1000~2000倍	—	収穫前日まで	2回以内	
キャベツ	アオムシ、コナガ			収穫3日前まで		
はくさい	ヨトウムシ			収穫7日前まで		
だいこん	アブラムシ類	1000倍	—	収穫21日前まで	3回以内	
ねぎ	シロイチモジトウ			収穫14日前まで		
レタス	アブラムシ類			収穫3日前まで		
すいか	アブラムシ類、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ					
メロン	アブラムシ類、コナジラミ類	1000~2000倍	—	—	4回以内	
なす	コナジラミ類					
ピーマン	アブラムシ類	1000倍	100~300ℓ	—	3回以内	
オクラ	アブラムシ類、カメムシ類					
きゅうり	コナジラミ類、アブラムシ類					
にがうり	アブラムシ類、ウリノメイガ、カメムシ類、コナジラミ類、ヨトウムシ類					
かぼちゃ	ウリハムシ					
トマト	コナジラミ類					
さやえんどう	シロイチモジトウ					
実えんどう	ヨトウムシ、ウラナミシジミ					
さやいんげん	ワタアブラムシ、ウラナミシジミ、マメノメイガ					
だいず	アブラムシ類、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、アズキノメイガ					
えだまめ	マメシクイガ、シロイチモジダラメイガ、カメムシ類	1000~2000倍	—	収穫14日前まで	2回以内	
	ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ					
未成熟さやげ	ウコンノメイガ、ツメクサガ	1000倍	—	—	3回以内	
うど	ハスモンヨトウ					
あしたば	アブラムシ類					
みつば	アブラムシ類	1000倍	—	収穫21日前まで	2回以内	
食用ぎく	アブラムシ類	2000倍	—	収穫3日前まで	1回	
モロヘイヤ	アザミウマ類	1000倍	200~700ℓ	—	3回以内	
かんきつ	コアオハナムグリ、ケシキスイ類	1000~2000倍		収穫14日前まで		
	ミカンハモグリガ	2000倍		—		
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	1000倍	—	収穫7日前まで	2回以内	
小麦	ヒメトビウンカ、アブラムシ類	2000倍	60~150ℓ	—	2回以内	
きび	アカスジカスミカメ	1000倍	100~300ℓ	—	3回以内	
あわ	アワトウ					
とうもろこし	アワノメイガ、アワトウ					
ばれいしょ	アブラムシ類					
かんしょ	ナガシロシタバ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ					
さといも	ハスモンヨトウ					
さといも(葉柄)	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、ハスモンヨトウ					
やまのいも	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、ハスモンヨトウ					
やまのいも(むかひ)	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、ハスモンヨトウ					
豆類	アズキノメイガ					
(種実、ただし、だいず、あずきを除く)	マメシクイガ、アブラムシ類、シロイチモジダラメイガ					
あずき	ダイズサヤタマバエ、カメムシ類、フタスジヒメハムシ					
ほろきぎ	アブラムシ類、ウラナミシジミ	200~400ℓ	25~180ℓ	—	2回以内	
しょうが	ホウキギツツミノガ					
しょうが	アブラムシ類					
ふき	コナジラミ類、フキノメイガ、ヨトウムシ	1000~2000倍	—	—	3回以内	
てんさい	ヨトウムシ					
茶	チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマ	2000倍	200~400ℓ	摘採21日前まで	2回以内	
たばこ	タバコガ、ヨトウムシ	1000~2000倍	—	—		
樹木類(つじ類、ポインセチア、ソテツを除く)	ケムシ類、シャクトリムシ類	4000倍	100~700ℓ	—	6回以内	
	オビカラレ	2000倍				
つつじ類	ツツジゲンバイ	2000倍	—	幼虫発生期	6回以内	
	オビカラレ	4000倍	—			
ポインセチア	ケムシ類、シャクトリムシ類	4000倍	—	幼虫発生期	6回以内	
	オビカラレ	2000倍	—			
ソテツ	コナジラミ類	1000倍	—	幼虫発生期	6回以内	
	クロマダラソテツシジミ	2000~4000倍	—			
	ケムシ類、シャクトリムシ類	4000倍	—			
宿根かすみそう	オビカラレ	2000倍	100~150ℓ	—	2回以内	
	シロイチモジトウ	1000倍				
りんどう	シロイチモジトウ	1000倍	—	—	3回以内	
きく	ヒラスハナアザミウマ					
カーネーション	アブラムシ類					
ゆり	アブラムシ類	1000倍	—	発生初期	6回以内	
トルコギキョウ	ハスモンヨトウ					
せんきゅう	ウリハムシモドキ	1000倍	—	—	2回以内	
採種用とうき	アブラムシ類					
せり(水耕栽培)※※	アブラムシ類					
せり※※※	アブラムシ類	1000倍	—	—	3回以内	
みずいも※※※	オキナワイナゴモドキ					

※休耕田：ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田
※※せり(水耕栽培)の適用場所はガラス室等の施設 ※※※せり、みずいもの適用場所は水田

●ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。●空容器は圃場等に放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

本印刷物は2019年11月現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

1724(19-11)



自然に学び 自然を守る

クミアイ化学工業株式会社

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL.03-3822-5036
ホームページアドレス <https://www.kumiai-chem.co.jp>