

水稻用初期除草剤

# ショキニー<sup>®</sup>

## 1キロ粒剤・250グラム 豆つぶ<sup>®</sup>・フロアブル



ホタルイ、コナギ、アゼナ類に

優れた効果!!



# 水稻用初期除草剤 シヨキニー<sup>®</sup>

## 1キロ粒剤

有効成分：プロモブチド…9.0% ベントキサゾン…2.0%  
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

## 250グラム(豆つぶ<sup>®</sup>)

有効成分：プロモブチド…24.0% ベントキサゾン…6.0%  
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

## プロアブル

有効成分：プロモブチド…18.0% ベントキサゾン…4.0%  
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

### 特長

SU剤抵抗性ホタルイやアゼナ類に優れた効果を示します。

効果の持続期間が長く、幅広い雑草の発生を抑えます。

移植水稻に対して高い安全性を示します。

### 適用雑草と使用方法

#### 1キロ粒剤

農林水産省登録 第24357号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバヤ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ クログワイ、シズイ、コウキヤガラ	移植直後～ノビエ1葉期 但し、 移植後30日まで	1kg	湛水散布 又は 無人航空機による散布
		移植時		田植同時散布機で施用

●総使用回数 本剤…1回 プロモブチド剤…2回以内 ベントキサゾン剤…2回以内

#### 250グラム

農林水産省登録 第20993号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバヤ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ	移植直後～ノビエ1葉期 但し、 移植後30日まで	250g	湛水散布、 湛水周縁散布、水口施用 又は 無人ヘリコプターによる散布

●総使用回数 本剤…1回 プロモブチド剤…2回以内 ベントキサゾン剤…2回以内

#### プロアブル

農林水産省登録 第19872号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバヤ、ホタルイ、ミズガヤツリ ヘラオモダカ、クログワイ	移植時	500mL	田植同時散布機で施用
		移植直後～ノビエ1葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布 又は 水口施用
	水田一年生雑草 及び マツバヤ、ホタルイ、ミズガヤツリ	移植後30日まで	300mL (少量散布)	原液湛水散布

●総使用回数 本剤…1回 プロモブチド剤…2回以内 ベントキサゾン剤…2回以内

### ⚠ 使用上の注意事項(抜粋)

#### [共通]

- 雑草の発生前から発生始年に有効なので、ノビエの1葉期までに時期を失しないように散布してください。
- れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- 散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 魚毒性等
  - ・水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
  - ・無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。(1キロ粒剤)
  - ・散布後は水管理に注意してください。
  - ・散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

#### [1キロ粒剤]

- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ミズガヤツリは1葉期まで、ヘラオモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラは発生始期までが散布適期です。

本資料は2020年9月現在の知見に基づき作成しております。

#### [250グラム]

- 多年生雑草は生育段階によって効果にふれがでるので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカに対しては発生始期までが散布適期です。
- 湛水散布または湛水周縁散布にあたっては、やや深めの湛水状態(水深5～6cm)にして水の出入りを止めてください。
- 水口施用の場合は、あらかじめ1～2cm程度水深を確保した状態で、入水時に水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、施用後田面水が通常の湛水状態(湛水深3～5cm)に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないよう注意してください。
- 藻類・表層はく離などの水面浮遊物が多い場合は、拡散が不十分になるおそれがあるため、周縁部散布を避け、本田内で、水田全面に散布してください。
- 吸湿性があるので、ぬれた手で作業したり、降雨でぬれることがないように注意してください。また、開封後は早めに使用してください。

#### [プロアブル]

- 多年生雑草は生育段階によって効果にふれがでるので、必ず適期に散布するようにしてください。ホタルイは1葉期まで、ミズガヤツリは発生始期まで、クログワイは発生前が散布適期です。
- 散布の場合は、湛水状態(水深3～5cm)で水の出入りを止めて散布してください。また、極端な浅水や深水での使用はさせてください。
- 水口施用の場合は、入水時に水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させてください。処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3～5cm)に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください ●ラベルの記載以外に使用しないでください ●小児の手の届く所に置かないでください ●防除日誌を記帳しましょう。

1897(20-10)