



自然に学び 自然を守る



殺ダニ剤

ダニコンゴ ポアブル®

ハダニをなげ伏せる!!



〈写真はイメージです〉

新規有効成分が
ハダニを
パワフルに撃退!!

適用拡大



すいか



ピーマン



りんご



かき



おうとう



なし



かんきつ



いちご



茶



殺ダニ剤

ダニゴン フロアブル

有効成分：ピフルブミド……………20.0%

安全性：普通物

(毒劇物に該当しないものを
指している通称)

特 長


新しいタイプの殺ダニ剤 …… 新規作用性を有し、
既存殺ダニ剤抵抗性個体群にも有効です。

残効性に優れる …… 残効性に優れ、安定した防除効果が長期間持続します。

天敵・有用昆虫に優しい …… 天敵・有用昆虫を含む非標的昆虫・クモ類への安全性が
高く、訪花性昆虫や天敵等の生物資材との併用にも
適しています。

既存電子伝達系
阻害剤に
効果が低下した
ハダニに対しても
パワフルな効果!!

りんご葉切取残効性試験



◆ ダニゴンフロアブル 2000倍
■ A剤 2000倍
▲ B剤 1000倍

日本農業株式会社(2009年)[社内試験]
作物:りんご 品種:ふじ
対象害虫:ナミハダニ
試験方法:5月28日に所定濃度の薬剤を40/樹散布。所定日に葉を切取り、
雌成虫を接種。接種10日後に次世代幼虫数を調査。

散布28日後も
安定した
防除効果を
発揮しました!!

適用病害虫および使用方法

が2020年4月に適用拡大になりました

(2020年4月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピフルブミドを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	2000~4000倍					
かき							
りんご							
なし							
ぶどう							
もも							
ネクタリン							
いちじく							
おうとう							
小粒核果類	ナミハダニ						
アスパラガス							
すいか							
なす							
メロン							
いちご							
ピーマン							
しそ							
しそ(花穂)							
みょうが(花穂)							
みょうが(茎葉)							
茶	カンザワハダニ	2000~4000倍	200~400ℓ/10a	摘採7日前まで			
花き類・観葉植物	ハダニ類	2000倍	100~300ℓ/10a	発生初期			

※みょうが(花穂)の収穫前日まで。但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで

注意事項

■石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用をさけてください。

■植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。

■ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。

■ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので、年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。

■適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

■散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器・空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

1818(20-11)