

果菜類・葉菜類の害虫防除に。

クミアイ

野菜散布用殺虫剤

ベネビア[®] OD

powered by
CYAZYPYR[®]
ACTIVE INGREDIENT



「たまねぎ・アザミウマ類」
2000~4000倍に変更

「にんにく」
「かんしょ・イモゾウムシ」
を追加

農林水産省登録：第23554号

有効成分：シアントラニプロロール(通称：サイアジビル[®])…10.3%

■適用害虫と使用方法 (色文字が適用拡大部分) 2021年1月13日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ ウババコガ、オオタバコガ	2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は3回以内)
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍					
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類、キスジノミハムシ	2000倍					
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ カブラハバチ、ダイコンサルハムシ	2000~4000倍					
	アブラムシ類、ハモグリバエ類 キスジノミハムシ	2000倍					
	ヨトウムシ	4000倍					
ブロッコリー	アオムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	2000~4000倍					
	アザミウマ類、アブラムシ類	2000倍					
トマト ミニトマト	オオタバコガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類、ハモグリバエ類	2000倍					
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類 ハモグリバエ類、ウリノメイガ	2000倍					
レタス 非結球レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000~4000倍					
	ハモグリバエ類、アブラムシ類	2000倍					
ピーマン	オオタバコガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類	2000倍					
ししとう	オオタバコガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類	2000倍					
いちご	ハスモンヨトウ	2000~4000倍					
	アザミウマ類	4000倍					
アスパラガス	アザミウマ類	2000倍					
オクラ	アブラムシ類	2000倍					
	アザミウマ類	2000倍					
えだまめ	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類	2000倍					
だいず	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ	2000~4000倍					
	アブラムシ類	2000倍					
さやいんげん かぼちゃ	ハスモンヨトウ	4000倍					
	ハモグリバエ類	2000倍					
ねぎ	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類	2000倍					
	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	2000~4000倍					
たまねぎ	アザミウマ類	2000倍					
にんにく	アザミウマ類、ネギコガ	2000倍					
やまのいも	ナガイモコガ、ハスモンヨトウ、アブラムシ類	2000倍					
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、イモゾウムシ アリモドキゾウムシ、ヨツモンカメノコハムシ	4000倍					
	ハスモンヨトウ	2000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類	2000倍					
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、キアゲハ	4000倍					
にんじん	ムギクビレアブラムシ	2000倍					
	アワノメイガ、オオタバコガ	4000倍					
未成熟 とうもろこし	アワノメイガ、オオタバコガ	4000倍					
たばこ	ヨトウムシ	4000倍					

