

各位

全 5 ページ
登録速報(2021-204)
2021年 9月29日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録(負の登録)となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日: 2021年9月29日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号	第 18563 号
名 称	クミアイアドマイヤーフロアブル

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、次の事項を変更し、別紙【変更後】とする。

- ・ 作物名「とうもろこし」、「ヤングコーン」、「ズッキーニ」、「非結球あぶらな科葉菜類(みずなを除く)」を削除する。
- ・ 作物名「きゅうり」を「きゅうり(施設栽培)」に、「ピーマン」を「ピーマン(施設栽培)」に、「オクラ」を「オクラ(施設栽培)」に、「未成熟ささげ」を「未成熟ささげ(施設栽培)」に、「食用ぎく」を「食用ぎく(施設栽培)」に、「きく」を「きく(施設栽培)」に、「ポインセチア」を「ポインセチア(施設栽培)」にそれぞれ変更する。
- ・ 以下の作物名の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)」を追加する。
びわ、もも、なし、あんず、ぶどう、かんきつ、キウイフルーツ、デイゴ
- ・ 作物名「つつじ類」の使用手法「散布」の使用時期を、「発生初期(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)」に変更する。

- ・以下の作物名の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については開花期終了後)」を追加する。

れんこん、未成熟そらまめ

- ・以下の作物名の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については着果後)」を追加する。

メロン、かぼちゃ、すいか

- ・作物名「かんきつ」の適用病害虫から、「ケシキスイ類」及び「コアオハナムグリ」を削除する。

- ・作物名「みずな」の総使用回数を「2回以内」に変更する。

- ・作物名「きく(葉)」を「きく(葉)(施設栽培)」に変更する。

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容農薬登録申請書第8項「使用上の注意事項」のうち(4)を以下のとおり変更する。

(4) ミツバチ 及び野生ハナバチ類 に対して影響があるので、以下のことに注意すること。

- 1) ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
- 2) 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
- 3) 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 4) 開花期終了後に使用する場合、適用作物の花弁の大部分が落下又は乾燥するか、花が閉じてから使用すること。
- 5) 施設栽培と記載のある作物に使用する場合、外部からミツバチ及び野生ハナバチ類が入らない形態の施設等で使用すること。
- 6) メロン、すいか、かぼちゃの露地栽培の場合、着果後は可能な限り摘花に努めること。
- 7) しそ、しそ科葉菜類(しそを除く)に露地栽培で使用する場合、収穫後は開花期前に植物体を撤去すること。
- 8) 花き類・観葉植物のうち、開花する植物に露地栽培で使用する場合は、開花期終了後に使用すること。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
<u>びわ</u>	アブラムシ類 カメムシ類	2000倍	200～700 L/10a	収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	2回以内	散布	2回以内
<u>もも</u>	アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類	5000倍	200～700 L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)		散布	
<u>なし</u>	アブラムシ類		200～700 L/10a	収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)		散布	
<u>あんず</u>	アブラムシ類		200～700 L/10a	収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)		散布	
<u>ぶどう</u>	アザミウマ類	200～700 L/10a	収穫21日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	散布			
<u>かんきつ</u>	カイガラムシ類 アザミウマ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 アブラムシ類 コマダラカミキリ成虫	2000～ 5000倍	200～700 L/10a	収穫14日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	3回以内	散布	3回以内
	ミカンハエ	2000～ 4000倍					
	ミカンキンラム	2000倍					
	アブラムシ類 アザミウマ類 カメムシ類 コマダラカミキリ成虫	80倍				8～20 L/10a	
ミカンハモグリガ ミカンハエ ミカンキンラム	40倍	4～10 L/10a					
	20倍	4～5 L/10a					
<u>キウイ フルーツ</u>	カメムシ類	2000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	2回以内	散布	2回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イタコフ®リトを含む農薬の総使用回数
<u>みずな</u>	アブラムシ類	4000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	<u>2回以内</u>
<u>れんこん</u>	アブラムシ類	4000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで <u>(ただし、露地栽培については開花期終了後)</u>	2回以内	散布	3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内)
<u>きゅうり</u> <u>(施設栽培)</u>	アブラムシ類 アザミウマ類	4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内)
<u>メロン</u>	アブラムシ類 アザミウマ類			収穫3日前まで <u>(ただし、露地栽培については着果後)</u>			4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)
<u>かぼちゃ</u>	アブラムシ類			収穫前日まで <u>(ただし、露地栽培については着果後)</u>	2回以内		3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
<u>すいか</u>				収穫3日前まで <u>(ただし、露地栽培については着果後)</u>	3回以内		4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
<u>ピーマン</u> <u>(施設栽培)</u>				収穫前日まで	2回以内		3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
<u>オクラ</u> <u>(施設栽培)</u>				アブラムシ類 アザミウマ類	3回以内		3回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
<u>未成熟そらまめ</u>	アブラムシ類	4000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで <u>(ただし、露地栽培については開花期終了後)</u>	3回以内	散布	3回以内 (定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内)
<u>未成熟ささげ</u> <u>(施設栽培)</u>	アブラムシ類	4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
<u>きく(葉)</u> <u>(施設栽培)</u>	アブラムシ類	4000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
<u>食用ぎく</u> <u>(施設栽培)</u>	アブラムシ類	4000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
<u>きく</u> <u>(施設栽培)</u>	アザミウマ類	2000倍	100～200 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
<u>ポインセチア</u> <u>(施設栽培)</u>	アブラムシ類 コナジラミ類				5回以内	散布	
<u>つつじ類</u>	ツツジゲンハイ	2000倍	100～200 L/10a	発生初期 <u>(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)</u>	5回以内	<u>散布</u>	5回以内 (株元灌注は2回以内、土壌混和は2回以内)
		5000倍	1L / m ²	発生前	2回以内	株元灌注	
<u>デイゴ</u>	デイゴヒメコバチ	2000倍	200～700 L/10a	発生初期 <u>(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)</u>	2回以内	散布	2回以内

以上