

各位

全 4 ページ
登録速報(2021-202)
2021年 9月29日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録（負の登録）となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2021年9月29日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号	第 18212 号
名 称	クミアイアドマイヤー水和剤

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、次の事項を変更し、別紙【変更後】とする。

- ・ 作物名「稲」（使用方法「散布」）を削除する。
- ・ 作物名「きゅうり」について、使用方法「散布」の作物名を「きゅうり(施設栽培)」に変更する。
- ・ 作物名「ピーマン」を「ピーマン(施設栽培)」に、「にがうり」を「にがうり(施設栽培)」に、それぞれ変更する。
- ・ 以下の作物名について、使用方法「散布」の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)」を追加する。

りんご、なし、もも、ネクタリン、ぶどう、かき、うめ、すもも、くり

- ・以下の作物名の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については着果後)」を追加する。

すいか、メロン

- ・作物名「ばれいしょ」について、イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数を「3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内)」に変更する。

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

農薬登録申請書第8項「使用上の注意事項」のうち(11)を以下のとおり変更する。

(11) ミツバチ 及び野生ハナバチ類 に対して影響があるので、以下のことに注意すること。

- 1) ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
- 2) 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
- 3) 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 4) 開花期終了後に使用する場合、適用作物の花弁の大部分が落下又は乾燥するか、花が閉じてから使用すること。
- 5) 施設栽培と記載のある作物に使用する場合、外部からミツバチ及び野生ハナバチ類が入らない形態の施設等で使用すること。
- 6) メロン、すいかの露地栽培の場合、着果後は可能な限り摘花に努めること。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イタクトールを含む農薬の総使用回数		
<u>りんご</u>	アブラムシ類 キンモンホリガ キンモンハモクリガ	1000～ 2000倍	200～700 L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	2回以内	散布	2回以内		
<u>なし</u>	アブラムシ類 カメムシ類 チュウゴクナシキンラムシ	1000倍							
<u>もも</u>	アブラムシ類 モモハモクリガ	1000～ 2000倍							
	カメムシ類	1000倍							
<u>ネクタリン</u>	アブラムシ類 モモハモクリガ	1000～ 2000倍		収穫14日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)					
	カメムシ類	1000倍							
<u>ぶどう</u>	アザミウマ類	1000～ 2000倍		収穫21日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)					
	フタテンヒメヨコバイ	1000倍							
<u>かき</u>	アザミウマ類	1000～ 2000倍		収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)				3回以内	3回以内
	カメムシ類	1000倍							
<u>うめ</u> <u>すもも</u>	アブラムシ類	2000倍	収穫21日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	2回以内	2回以内				
<u>くり</u>	アブラムシ類	1000倍	収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	3回以内	3回以内				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イタダクワリトを含む農薬の総使用回数
<u>きゅうり</u> (施設栽培)	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回 以内	<u>散布</u>	4回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は 合計1回以内、散布 及び常温煙霧は 合計3回以内)
<u>すいか</u>	アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで (ただし、 <u>露地 栽培については着果後</u>)	3回 以内	散布	4回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内、散布は3回以内)
<u>メロン</u>	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類			4回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は合 計1回以内、散布は3 回以内)			
<u>にがうり</u> (施設栽培)	アザミウマ類			収穫前日まで	2回 以内		2回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内)
<u>ピーマン</u> (施設栽培)	アザミウマ類 アブラムシ類			収穫前日まで			3回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は合 計1回以内、散布は2 回以内)
<u>ばれいしょ</u>	アブラムシ類	1000～ 3000倍	100～300 L/10a	収穫14日前ま で	2回 以内	散布 無人航空機 による散布	<u>3回以内(植付時の 土壌混和は1回以 内、植付後の処理 は2回以内)</u>
		16倍	3.2L/10a				

以上