

きく・花き類の病害防除の定番!

攻守に優れた
ミラクルアシスト!!

殺菌剤

ファンタジスタ®

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



キク白さび病



シクラメン灰色かび病



トルコギキョウ斑点病

殺菌剤の
オールラウンド
プレイヤー



Offerance



特 長


- 有効成分は新規系統ベンジルカーバメート系の「ピリベンカルブ」です。
- 難防除病害であるキク白さび病に高い効果があります。
- 顆粒水和剤であるため、汚れが少ないです。
- 灰色かび病との同時防除ができます。

適用病害と使用方法 (抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物 (きく、トルコギキョウを除く)	灰色かび病	3000倍	100~300ℓ /10a	発病初期	5回以内	散 布	5回以内
き く	灰色かび病 白さび病						
トルコギキョウ	灰色かび病 斑点病						


試験事例

● 白さび病(きくのみ)に対する防除効果



■ 実施日時：2014年度委託試験
■ 試験場所：日植防炎城
■ 作物(品種)：きく(秀芳の力)
■ 発生状況：少発生(自然発生)
■ 散布日：4/29、5/9、5/19、5/29(4回散布)
■ 調査日：6/9(最終散布11日後)
■ 調査方法：80葉について発病調査を行った(無処理発病度：9.6)

● 灰色かび病に対する防除効果



■ 実施日時：2013年度委託試験
■ 試験場所：日植防炎城
■ 作物(品種)：ピオラ(ソフトピンク)
■ 発生状況：多発生(接種)
■ 散布日：3/26、4/4(2回散布)
■ 調査日：4/11(最終散布7日後)
■ 調査方法：16株の全花について発病調査を行った(無処理発病率：36.3%)

使用上の注意事項 (抜粋)

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- スイトピーへの散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は園場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2022年2月22日現在の登録内容に基づいています。



JAグループ

農 協 | 全 農 | 経 済 連

登録商標 第4702318号



自然に学び 自然を守る

クミアイ化学工業株式会社

本社：東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL03-3822-5036
ホームページ <https://www.kumiai-chem.co.jp>



最新の登録内容

きく・花き類の病害防除の定番

攻守に優れたミラクルアシスト