

長く斬る! まとめて斬る!



田植え同時処理もできます。
(1キロ粒剤)

水稻用 初・中期一発処理除草剤

ナギナタ®

1キロ粒剤 豆つぶ[®] 250 ジャンボ



MFP-100
ピリミスルファン
ベンゾビシクロロン

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標

水稻用 初・中期一発処理除草剤



●有効成分 オキサジクロメホン…0.60%(1キロ粒剤)1.6%(豆つぶ250・ジャンボ)
ビリミスルファン…0.55%(1キロ粒剤)2.2%(豆つぶ250・ジャンボ)
ベンゾピシクロン…3.0%(1キロ粒剤)12.0%(豆つぶ250・ジャンボ)

●人畜毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指す)

特長

- ピリミスルファン配合で、ノビエから多年生雑草まで幅広い雑草に高い効果を示します。
- SU抵抗性雑草や特殊雑草のイボクサにも高い効果を有します。
- 水稻に対する安全性が高く、1キロ粒剤は田植同時、豆つぶ・ジャンボは田植直後から使用可能です。
- 直播栽培にも使用できます。
- 10アール当たり250gと軽量で、拡散性に優れた製剤です(豆つぶ250・ジャンボ)。

適用雑草及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草及び 多年生広葉雑草、 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	1kg	1回※	湛水散布
		移植時			田植同時 散布機で施用
直播水稻	一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、 アオミドロ・藻類による表層はく離	稻1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			湛水散布

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、 ヒルムシロ、セリ、オモダカ、 クログワイ、コウキヤガラ、 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	250g	1回※	湛水散布、 湛水周縁散布 又は 無人航空機による 散布
					湛水散布 又は 無人航空機による 散布
直播水稻	一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、 ヒルムシロ、セリ、オモダカ、 クログワイ、コウキヤガラ、 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (250g)	1回※	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる
直播水稻	一年生雑草及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、 ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ノビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			

*各有効成分を含む農業の総使用回数:オキサジクロメホン…2回以内、ピリミスルファン…2回以内、ベンゾピシクロン…3回以内

上手な使い方

標準的な使用時期

(雑草生育初期での使用が、より効果的です。)

●移植水稻



●直播水稻



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2022年1月現在の知見に基づいて作成しております。

自然に学び 自然を守る

2060(22-01)